

# Instituto Politécnico

Universidad Nacional de Rosario Universidad Nacional de

## Álgebra Vectorial

Ayacucho  
1600 1700

3<sup>o</sup> Año

## Matemática

Cód. 1302-15

Prof. Noemí Lagreca  
Prof. Mirta Rosito  
Prof. Susana Strazziuso



Dpto. de Matemática

Masterización: RECURSOS PEDAGÓGICOS



### I- Introducción


En diversas oportunidades nos hemos encontrado en temas relacionados con la Física, con magnitudes que quedan definidas mediante un número, las denominadas **magnitudes escalares**. Entre ellas, podemos citar la longitud, la masa, el volumen. Otras, en cambio, **las magnitudes vectoriales**, requieren además del número, para su definición, de elementos tales como dirección y sentido representados por segmentos orientados o flechas denominados **vectores**. Se cuenta entre estas últimas magnitudes, como ejemplo, las fuerzas, los desplazamientos, las velocidades, etc.

### II- Vector

#### II-1- Definición. Sus elementos

Se llama vector a todo segmento orientado, es decir, a todo segmento determinado por un par ordenado  $(a; b)$  de puntos. El punto  $a$  se llama origen y el punto  $b$  extremo del vector.

Para simbolizarlo usaremos  $\overrightarrow{ab}$  o simplemente  $\vec{u}$



Los elementos de un vector son tres, a saber:

#### ➤ Dirección


La *dirección* de un vector está dada por la recta que lo contiene o cualquiera de sus paralelas.

#### ➤ Sentido

La orientación del vector sobre la recta, definida por su origen y su extremo, determina el *sentido* del mismo.

En cada dirección hay dos sentidos.

Gráficamente el sentido de un vector es indicado con una flecha.



En la figura, los vectores  $\vec{ab}; \vec{dc}; \vec{ef}$  y  $\vec{hg}$  tienen la misma dirección pues están sobre las rectas paralelas  $A$  y  $B$ . Los vectores  $\vec{ab}$  y  $\vec{ef}$  tienen igual sentido y los vectores  $\vec{ab}$  y  $\vec{hg}$  tienen distinto sentido.

### ➤ Módulo

El *módulo* es la medida del segmento orientado.

El módulo de un vector  $\vec{ab}$  se simboliza  $\left| \vec{ab} \right|$


Por todo lo precedente, podemos decir que el *módulo de un vector* es siempre un número *no negativo*, o sea

$$|\vec{u}| \geq 0 \quad \forall \vec{u}$$

### Algunas definiciones:


\* Diremos que dos vectores  $\vec{ab}$  y  $\vec{cd}$  poseen:

- ♦ *Igual módulo:* si la medida de los segmentos  $ab$  y  $cd$  son iguales, respecto a la misma unidad de medida.
- ♦ *Igual dirección:* si ambos vectores están contenidos en la misma recta o rectas paralelas.
- ♦ *Igual sentido:*
  - si teniendo la misma dirección e incluidos en rectas paralelas no coincidentes, los segmentos  $\vec{ac}$  y  $\vec{bd}$  no tienen ningún punto en común.






- si teniendo la misma dirección e incluidos en la misma recta, existe un vector  $\vec{pq}$  no incluido en dicha recta, que tiene igual sentido que  $\vec{ab}$  y  $\vec{cd}$ .




◆ **Distinto sentido o sentido opuesto:**

- si teniendo la misma dirección e incluidos en rectas paralelas no coincidentes  $\vec{ac}$  y  $\vec{bd}$  se intersectan en un punto los segmentos  $\vec{bd}$  y  $\vec{ac}$



- si teniendo la misma dirección e incluidos en la misma recta, existe un vector  $\vec{pq}$  no incluido en dicha recta, que tiene sentido opuesto a uno de ellos e igual al otro.



- \* Dado un segmento  $ab$ , se llama **vector libre**  $\vec{ab}$  al conjunto de todos los vectores que tienen igual módulo, dirección y sentido que  $\vec{ab}$ , incluido el propio  $\vec{ab}$ . En lo sucesivo será indistinto trabajar con cualquiera de los elementos de dicho conjunto.

### II-2- Vector nulo

Llamaremos **vector nulo** a todo punto y lo notaremos  $\vec{o}$


El vector nulo es el único que tiene módulo cero y que no tiene definido ni dirección ni sentido.

### II-3- Vectores iguales

Dos vectores son iguales cuando son nulos o tienen igual módulo, dirección y sentido. En símbolos:


$$\vec{u} = \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} = \vec{v} = \vec{0} \vee \begin{cases} |\vec{u}| = |\vec{v}| \\ \text{direc. } \vec{u} = \text{direc. } \vec{v} \\ \text{sent. } \vec{u} = \text{sent. } \vec{v} \end{cases}$$

Ejemplo:



### II-4- Versor. Versor asociado

Se llama *versor* o *vector unitario* a cualquier vector de módulo uno.



$$|\vec{v}| = |\vec{w}| = |\vec{u}_0| = 1 \Leftrightarrow \vec{v}; \vec{w} \text{ y } \vec{u}_0 \text{ son versores}$$

**Para tener en cuenta:**  $\vec{u}_0$  por tener el mismo sentido que  $\vec{u}$  recibe el nombre de **versor asociado** a  $\vec{u}$





### II-5- Vector opuesto

Dado un vector cualquiera  $\vec{a}$ , se llama vector opuesto de  $\vec{a}$  y se simboliza  $-\vec{a}$ , al  $\vec{b}$  tal que:

$$\vec{b} = -\vec{a} \Leftrightarrow \begin{cases} \vec{b} = \vec{0} & \text{si } \vec{a} = \vec{0} \\ \vec{b} \neq \vec{0}; \vec{b} = \begin{cases} |\vec{a}| = |\vec{b}| \\ \vec{a} // \vec{b} \\ \text{sent } \vec{a} \neq \text{sent } \vec{b} \end{cases} & \vee \end{cases}$$

#### Para resolver

- 1) Dados los vectores de las figuras completa de modo que las siguientes expresiones resulten verdaderas



..... y ..... tienen distinta dirección

..... y ..... tienen igual dirección

..... y ..... tienen distinto sentido

2) Dibuja los vectores  $\vec{a}$ ;  $\vec{b}$ ;  $\vec{c}$  y  $\vec{t}$ , sabiendo que

- La dirección de  $\vec{a}$  es una recta horizontal y su sentido hacia la derecha, con  $|\vec{a}| = 3$
- La dirección de  $\vec{b}$  es una recta vertical y su sentido hacia abajo con  $|\vec{b}| = \frac{1}{2}|\vec{a}|$
- $\vec{b}$  y  $\vec{c}$  tienen igual dirección, igual módulo pero distinto sentido
- $\vec{t} = \overline{\vec{a}_0}$

3) Dado  $\vec{a}$  dibuja


a)  $\vec{v} // \vec{v} // \vec{a}$ ,  $\text{sent. } \vec{v} \neq \text{sent. } \vec{a}$  y  $|\vec{v}| = \frac{3}{2}|\vec{a}|$

b)  $\vec{m} / \vec{m} \perp \vec{a} \wedge |\vec{m}| = |\vec{a}|$

4) Determina si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). justifica la respuesta

a)  $|\vec{u}| > |\vec{u}_0|$

b) En los vectores de la figura es  $|\vec{u}| > |\vec{v}|$



c)  $\vec{u} // \vec{v} \Rightarrow \vec{u}_0 = \vec{v}_0$

d)  $|\vec{a}| > |\vec{b}| \Rightarrow |\vec{a}_0| > |\vec{b}_0|$


### III- Operaciones entre vectores

#### III-1- Suma de vectores. Definición

Dados los vectores  $\vec{u}$  y  $\vec{v}$ , se denomina suma de los vectores  $\vec{u}$  y  $\vec{v}$  a un vector que se nota  $\vec{u} + \vec{v}$  y se obtiene de la siguiente manera




Fijado arbitrariamente un punto  $a$ , queda determinado un punto  $b$  tal que  $\vec{u} = \vec{ab}$  y a su vez queda determinado un punto  $c$  tal que  $\vec{bc} = \vec{v}$ . Se llama suma de  $\vec{u}$  y  $\vec{v}$  al vector  $\vec{ac}$  así obtenido.



**NOTA:** se puede demostrar que la suma de vectores es independiente del punto  $a$  elegido y en consecuencia de los representantes  $\vec{ab}$  y  $\vec{bc}$  correspondientes.

### Para resolver

1) Dados los vectores  $\vec{t}; \vec{u}; \vec{v}$  y  $\vec{w}$  de la figura



i) Determina gráficamente

- a)  $\vec{u} + \vec{v}$
- b)  $\vec{v} + \vec{t}$
- c)  $\vec{u} + \vec{w}$

ii) Completa con la relación de orden que corresponda:

$|\vec{u} + \vec{v}| \dots\dots\dots |\vec{u}| + |\vec{v}|$

$|\vec{v} + \vec{t}| \dots\dots\dots |\vec{v}| + |\vec{t}|$

$|\vec{u} + \vec{w}| \dots\dots\dots |\vec{u}| + |\vec{w}|$

2) Prueba geoméricamente que:



$$\forall \vec{a} \text{ y } \vec{b} \text{ es } |\vec{a} + \vec{b}| \leq |\vec{a}| + |\vec{b}|$$

3) Dibuja dos vectores  $\vec{u}$  y  $\vec{v}$  tales que:

a)  $\vec{u} + \vec{v} = \vec{s} \quad \wedge \quad |\vec{s}| = |\vec{u}| + |\vec{v}|$

b)  $\vec{u} + \vec{v} = \vec{s} \quad \wedge \quad |\vec{s}| = 0$

¿Qué características tienen  $\vec{u}$  y  $\vec{v}$  en cada caso?

### III-2- Suma de vectores- Propiedades

Dados  $\vec{a}$ ;  $\vec{b}$  y  $\vec{c}$  se puede probar la validez de las siguientes propiedades.

a) La suma de vectores es **asociativa**

$$\vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}) = (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c}$$

b) La suma de vectores es **conmutativa**

$$\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$$

c) Existe el **elemento neutro**

$$\forall \vec{a} \text{ se tiene } \vec{a} + \vec{0} = \vec{0} + \vec{a} = \vec{a}$$

A  $\vec{0}$  se lo denomina *elemento neutro* de la suma de vectores.







d) Existe el **elemento opuesto**

$$\forall \vec{a} \exists -\vec{a} / \vec{a} + (-\vec{a}) = \vec{0}$$


### Para resolver

1) Suma los vectores indicados en cada uno de los casos siguientes si

$$|\vec{v}| = 2 \quad \text{y} \quad |\vec{w}| = 4$$



2) Dados los vectores  $\vec{a}$ ;  $\vec{b}$  y  $\vec{c}$




Dibuja:

i)  $\vec{d}$  /  $\vec{d} = \vec{a} + \vec{b} + (-\vec{c})$

$$\text{ii) } \vec{e} / \vec{e} = -(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})$$


### III-3- Diferencia entre dos vectores

$$\forall \vec{a}; \vec{b} \text{ es } \vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b})$$



#### Para resolver

1) Dados  $\vec{a}$  y  $\vec{b}$  de la figura



Construye:

- a)  $\vec{a} + \vec{b}$     b)  $-\vec{a} + \vec{b}$     c)  $\vec{a} - \vec{b}$     d)  $\vec{b} - \vec{a}$     e)  $-\vec{a} - \vec{b}$

¿Cómo son los vectores  $\vec{a} - \vec{b}$  y  $\vec{b} - \vec{a}$ ?


2) Verifica usando propiedades de la suma de vectores que:

$$\forall \vec{a}; \vec{c} \text{ es } \vec{a} + \vec{m} = \vec{c} \text{ con } \vec{m} = \vec{c} - \vec{a}$$

3) Verifica que si los vectores  $\vec{a}$  y  $\vec{b}$  con origen común determinan un paralelogramo, los vectores  $\vec{a} + \vec{b}$  y  $\vec{a} - \vec{b}$  están sobre las diagonales del paralelogramo



4) Dados  $\vec{d}$ ;  $\vec{e}$  y  $\vec{f}$



Dibuja cada uno de los siguientes vectores

a)  $\vec{g} = \vec{d} - (\vec{e} + \vec{f})$

b)  $\vec{u} = -\vec{d} + \vec{e} - \vec{u} + \vec{f} = \vec{0}$


5) Expresa en cada caso los vectores indicados en función de  $\vec{u}$  y  $\vec{v}$

a)

$\vec{bc} =$

$\vec{cb} =$

$\vec{ca} =$




b) abcd es un paralelogramo

$\vec{cd} =$

$\vec{da} =$

$\vec{db} =$

$\vec{ac} =$




6) En la figura tenemos un exágono regular de centro  $o$ .

Nombra:

a) tres vectores iguales que  $\vec{qp}$

b) tres vectores iguales a  $\vec{om}$



c) 4 vectores con el mismo módulo que  $\vec{sm}$

d) cuatro vectores con la misma dirección que  $\vec{oq}$

- Justifica la respuesta del apartado a)

7) Analiza si la siguiente proposición es verdadera. Justifica.

$$\left. \begin{array}{l} |\vec{a}| = 2 \\ |\vec{b}| = 3 \end{array} \right\} |\vec{a} + \vec{b}| = 5$$

8) Un nadador quiere atravesar un río nadando a una velocidad  $|\vec{v}_1| = 6 \frac{\text{km}}{\text{h}}$  en dirección perpendicular a la orilla; pero la corriente lo desplaza con una velocidad  $|\vec{v}_2| = 4 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ . Dibuja los vectores  $\vec{v}_1$  y  $\vec{v}_2$  (con una escala conveniente) y encuentra el vector  $\vec{v} / \vec{v} = \vec{v}_1 + \vec{v}_2$ . Este vector representa la velocidad de desplazamiento del nadador. La dirección de  $\vec{v}$  es la dirección real en que se mueve el nadador.

Calcula  $|\vec{v}|$  observando que quedó determinado un triángulo rectángulo.

## IV- Producto de un vector por un número real

### IV-1 Definición

Llamamos producto de un  $\vec{u}$  por un número real  $\alpha$ , o producto de un número  $\alpha$  por un vector  $\vec{u}$ , a un vector  $\vec{v}$  tal que:

- Si  $\alpha \neq 0 \wedge \vec{u} \neq \vec{0}$


$$\vec{v} = \alpha \cdot \vec{u} = \begin{cases} |\vec{v}| = |\alpha| |\vec{u}| \\ \vec{v} // \vec{u} \\ \text{sentido de } \vec{v} = \text{sentido de } \vec{u} \text{ si } \alpha > 0 \\ \text{sentido de } \vec{v} \neq \text{sentido de } \vec{u} \text{ si } \alpha < 0 \end{cases}$$

- Si  $\alpha = 0 \vee \vec{u} = \vec{0} \Rightarrow \vec{v} = \vec{0}$



Ejemplos:

1)



$$\vec{ab} = \vec{bc} = \vec{cd} = \vec{de} = \vec{ef} = \vec{t}$$


$$\vec{bd} = 2\vec{t}$$

$$\vec{ec} = (-2)\vec{t} \quad \vec{cf} = 3\vec{t}$$

$$\vec{af} = 5\vec{t}$$

$$\vec{fe} = (-1)\vec{t}$$

2)



$$\vec{ab} = -\frac{7}{3}\vec{d}$$


Para resolver

9) Dibuja los vectores  $\vec{t}$ ,  $\vec{l}$  y  $\vec{m}$  tales que

a)  $\vec{t} = 0,5 \vec{a}$

b)  $\vec{l} = \frac{5}{3} \vec{a}$

c)  $\vec{m} = -3\vec{a}$



### IV-2 Propiedades del producto de un vector por un número

Para cualquier par de vectores  $\vec{u}$  y  $\vec{v}$  y los números reales  $\alpha$  y  $\beta$  se pueden demostrar las siguientes propiedades

i)  $\alpha(\vec{u} + \vec{v}) = \alpha\vec{u} + \alpha\vec{v}$

ii)  $(\alpha + \beta)\vec{u} = \alpha\vec{u} + \beta\vec{u}$


iii)  $\alpha(\beta\vec{u}) = (\alpha\beta)\vec{u}$

iv)  $1\vec{v} = \vec{v}$

### Para resolver

1) ¿Por qué  $(-1)\vec{u} = -\vec{u}$  ?


2) Dados  $\vec{a}$ ;  $\vec{b}$  y  $\vec{c}$



Representa gráficamente  $\vec{w}$  siendo:

$$\vec{w} = -\frac{1}{2}\vec{a} + \frac{2}{3}\vec{b} - \vec{c}$$

3) Siendo



e) dibuja  $\frac{1}{|\vec{v}|} \cdot \vec{v}$  y  $-\frac{1}{|\vec{v}|} \cdot \vec{v}$

f) demuestra que  $\frac{1}{|\vec{v}|} \cdot \vec{v}$  es el versor asociado ( $\vec{v}_0$ ) de  $\vec{v}$

### IV-3 Vectores paralelos

Dos vectores no nulos son paralelos cuando poseen la misma dirección

En símbolos:  $\vec{a} // \vec{b} \Leftrightarrow \text{dirección de } \vec{a} = \text{dirección de } \vec{b}$



### Propiedad de los vectores paralelos

Dados dos vectores paralelos  $\vec{u}$  y  $\vec{v}$  existe siempre un número real  $\lambda$  ( $\lambda \neq 0$ ) tal que  $\vec{v} = \lambda \vec{u}$

En símbolos:  $\vec{u} // \vec{v} \Leftrightarrow \exists \lambda \in \mathbb{R} - \{0\} / \vec{v} = \lambda \vec{u}$

Notemos que si:  $\vec{v} = \lambda \vec{u}$ , entonces

$$|\vec{v}| = |\lambda| |\vec{u}|$$


de donde

$$|\lambda| = \frac{|\vec{v}|}{|\vec{u}|}$$

como  $|\vec{v}|$  y  $|\vec{u}|$  son números reales y  $|\vec{u}| \neq 0$  siempre existe el cociente  $\frac{|\vec{v}|}{|\vec{u}|}$  que nos da el valor absoluto del número  $\lambda$  buscado, en cuanto si es positivo o negativo dependerá que  $\vec{u}$  y  $\vec{v}$  tengan igual o distinto sentido.

### Para resolver


- 1)  $\vec{a}$ ;  $\vec{b}$  y  $\vec{c}$  son los vectores paralelos cuyos sentidos están indicados en la figura con  $|\vec{a}| = 2$ ;  $|\vec{b}| = 4$  y  $|\vec{c}| = 3$



- a) calcula  $\lambda$  y  $\mu$  tal que  $\vec{a} = \lambda \vec{b}$  y  $\vec{b} = \mu \vec{c}$

- b) determina  $|\vec{t}|$  si  $\vec{t} = \vec{a} + \vec{b} - \vec{c}$

- 2) En la figura  $|\vec{a}| = 3$ ;  $|\vec{b}| = 6,5$   $\vec{a} // \vec{b}$







Construye el vector  $\vec{v}$  tal que  $\vec{v} = \vec{a} - \frac{3}{5}\vec{b}$

3) Calcula el valor de  $k$  si  $|k\vec{v}| = 5\sqrt{2}$  y  $|\vec{v}| = 2\sqrt{2}$


4) Reproduce la siguiente figura y averigua cuánto vale el número  $x$  tal que  $\vec{v} = x\vec{w}$



5) Sea la figura siguiente con  $|\vec{ab}| = 6$  y  $|\vec{cd}| = 7.2$  con respecto al centímetro, construye el vector  $\vec{v}$  tal que  $\vec{v} = -\frac{1}{3}\vec{cd} - \frac{2}{3}\vec{ab}$



6) Se dan los vectores  $\vec{u}$  y  $\vec{v}$  de la figura, determina el valor de  $x$  tal que  $\vec{v} = x\vec{u}$



7) Se da un vector  $\vec{i}$ . Dibuja los vectores:  $5\vec{i}$ ;  $-\frac{5}{2}\vec{i}$ ;  $\frac{1}{2}\vec{i}$ , construye la suma  $\vec{v}$  de dichos vectores y determina  $x$  tal que  $\vec{v} = x\vec{i}$




- 8) Dibuja un triángulo  $abc$  cualquiera y marca dos puntos  $t$  y  $s$  tales que  $\vec{bt} = \vec{ac}$  y  $\vec{cs} = \vec{ba}$ . Determina, justificando tu respuesta si  $t$ ,  $c$  y  $s$  están alineados.

### V Sistema de coordenadas cartesiano ortogonal

#### V -1- Definición

Un sistema de referencia o de coordenadas cartesiano ortogonal en el plano está constituido por un punto fijo y dos versores perpendiculares con origen en él. Sea  $o$  el punto fijo,  $\vec{i}$  y  $\vec{j}$  los versores perpendiculares.



En símbolos:

$o$  punto fijo

$\vec{i} \perp \vec{j}$


$|\vec{i}| = |\vec{j}| = 1$

$\Rightarrow \{o; \vec{i}; \vec{j}\}$ : sistema de referencia cartesiano ortogonal

#### V-2- Vector posición

Dado en un plano el sistema de referencia  $\{o; \vec{i}; \vec{j}\}$ , definimos como **vector posición** en el plano a todo vector con origen en ese punto  $o$ . Por consiguiente, cualquier punto  $p$  del plano determina el vector posición  $\vec{op}$ .

Por el extremo  $p$  trazamos las rectas perpendiculares a  $\vec{i}$  y a  $\vec{j}$  respectivamente, hasta cortar a las rectas que contienen a estos vectores. Sean  $a$  y  $b$  los puntos así obtenidos.



Como  $\vec{oa}$  es paralelo a  $\vec{i}$ , según la propiedad de vectores paralelos, resulta:

$$\vec{oa} = \lambda \vec{i} \quad \text{con} \quad \lambda = x_p \quad (\text{abscisa del punto } p)$$

luego:

$$\vec{oa} = x_p \vec{i}$$

+  
de donde

$$|\vec{oa}| = x_p \underbrace{|\vec{i}|}_1$$

siendo

$$\text{sentido de } \vec{oa} = \text{sentido de } \vec{i} \quad \text{si} \quad x_p > 0$$

$$\text{sentido de } \vec{oa} \neq \text{sentido de } \vec{i} \quad \text{si} \quad x_p < 0$$

Análogamente

$$\vec{ob} = y_p \vec{j} \quad \text{con} \quad y_p : \text{ordenada del punto } p$$

De acuerdo a la definición de suma de vectores es:

$$\vec{op} = \vec{oa} + \vec{ob} = x_p \vec{i} + y_p \vec{j}$$

Entonces

$$\boxed{\vec{op} = x_p \vec{i} + y_p \vec{j}}$$

es la **expresión canónica o cartesiana** del vector  $\vec{op}$

- Los vectores  $\vec{oa}$  y  $\vec{ob}$  se llaman **componentes vectoriales** de  $\vec{op}$
- Los escalares  $x_p$  e  $y_p$  se llaman **componentes escalares** de  $\vec{op}$




En símbolos :

$$\vec{op} = (x_p ; y_p)$$

- Queda establecida una **correspondencia biunívoca** entre los puntos del plano y los pares ordenados de reales que caracterizan dichos puntos en el sistema de referencia ubicado en él y entre estos últimos y los vectores de posición con extremos en los primeros.

Resumiendo:



- $p \in \alpha \longleftrightarrow p(x; y) \longleftrightarrow \vec{op}$  en un  $\{o; \vec{i}; \vec{j}\}$
- Se llaman **ejes coordenados** a las rectas que pasan por  $o$  y tienen la dirección de los vectores  $\vec{i}$  (eje de las abscisas o eje de la  $x$ ) y  $\vec{j}$  (eje de las ordenadas o de las  $y$ )

### Para resolver

- 1) Determina cuáles son las componentes escalares de
  - a)  $\vec{i}$
  - b)  $\vec{j}$
  - c)  $\vec{o}$
- 2) Completa de modo que resulten verdaderas las siguientes proposiciones
  - a)  $p(x; \dots) \in$  eje de las abscisas con  $x \in \mathbb{R}$
  - b)  $p(0; y) \in$  eje ..... con  $y \in \mathbb{R}$
- 3) Representa en distintos sistemas de referencia los siguientes subconjuntos de puntos

a)  $A = \{(x; y) / x = -2 \wedge -1 \leq y \leq 3\}$

b)  $B = \{(x; y) / x \geq -1 \wedge y < 3\}$

c)  $C = \{(x; y) / |x| < 2 \wedge |y| = 1\}$


d)  $D = \{(x; y) / x > -\frac{2}{3} \vee y < \sqrt{2}\}$

e)  $E = \{(x; y) / x \in \mathbb{Z}; y \in \mathbb{Z}; x \cdot y = 12\}$


f)  $F = \{(x; y) / x \in \mathbb{Z}; y \in \mathbb{Z}; x^2 + y^2 = 25\}$

4) Caracteriza, en símbolos, a los siguientes conjuntos de puntos

a)




b)







c)



d)



e)




5) Dados en un  $\{o; \vec{i}; \vec{j}\}$   $a(4;1)$  y  $b(-2;0)$  determina:

a) componentes escalares de  $\vec{oa}$

- b) componentes vectoriales de  $\vec{ob}$
- c) expresión cartesiana o canónica de  $\vec{oa}$  y  $\vec{ob}$
- d)  $\left| \vec{ob} \right|$
- e)  $\alpha / \vec{ob} = \alpha \vec{i}$

### V-4 Componentes escalares de un vector no posición

Dados en un  $\{o; \vec{i}; \vec{j}\}$   $p_0(x_0; y_0)$  y  $p_1(x_1; y_1)$




resulta:

$$\vec{op_0} + \vec{p_0p_1} = \vec{op_1} \quad (1) \quad \vec{p_0p_1} = \vec{op_1} - \vec{op_0} \quad (2)$$

$$(2) \quad \vec{p_0p_1} = (x_1\vec{i} + y_1\vec{j}) - (x_0\vec{i} + y_0\vec{j}) \quad (3) \quad \vec{p_0p_1} = (x_1\vec{i} - x_0\vec{i}) + (y_1\vec{j} - y_0\vec{j}) \quad (4)$$

(4)  
 $\Rightarrow$



$(x_1 - x_0)\vec{i}$  y  $(y_1 - y_0)\vec{j}$  son las componentes vectoriales de  $\vec{p_0p_1}$




- (1) definición de resta de vectores
- (2) reemplazando a cada vector por su expresión cartesiana
- (3) propiedad de suma de vectores
- (4) propiedad del producto de un vector por un escalar

**Para resolver**

1) Dados en un  $\{o; \vec{i}; \vec{j}\}$   $a(1;-3)$ ;  $\vec{ob} = -\vec{i} + 2\vec{j}$ ;  $\vec{oc} = (0;3)$ , determina:

- a. la expresión canónica de  $\vec{ab}$
- b. componentes escalares de  $\vec{bc}$
- c. componentes vectoriales de  $\vec{ac}$
- d. representación gráfica de  $-\vec{ab}$  y  $\vec{cb}$

2) Identifica los vectores de la figura



$$\vec{a} = (4;4); \vec{b} = (3;-2); \vec{c} = (1; -1); \vec{d} = (-2;-1); \vec{e} = (2; 5); \vec{f} = (-3; 0)$$

### V- 5 - Igualdad de vectores

Los vectores  $\vec{u} = (u_1; u_2)$  y  $\vec{v} = (v_1; v_2)$ , son iguales si y solo si sus componentes son iguales.

En símbolos:

$$\vec{u} = \vec{v} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = v_1 \\ u_2 = v_2 \end{cases}$$

**Para resolver**

3) Dados en un  $\{o; \vec{i}; \vec{j}\}$ ;  $a(-2;3)$ ;  $\vec{oc} = 2\vec{i} + \vec{j}$ ;  $\vec{ob} = (2;5)$ , determina:

- a) la representación gráfica de  $\vec{u} / \vec{u} = \vec{ab} = \vec{cp}$



b) analíticamente las coordenadas de  $p$


c) ¿es  $\vec{qr} = \vec{ab}$ ? siendo  $q(5; 0)$  y  $r(8; 2)$ . Justifica

### V- 6- Distancia entre dos puntos de un plano. Módulo de un vector

Dados los puntos  $p_0(x_0; y_0)$  y  $p_1(x_1; y_1)$  teniendo en cuenta las componentes vectoriales de  $\vec{p_0p_1}$  y la aplicación del Teorema de Pitágoras, resulta:

$$\text{Dist}(p_0p_1) = \left| \vec{p_0p_1} \right|$$

$$\left| \vec{p_0p_1} \right|^2 = \left| \vec{p_0t} \right|^2 + \left| \vec{tp_1} \right|^2 \quad (1)$$



de donde

$$\vec{p_0t} = (x_1 - x_0)\vec{i} \Rightarrow \left| \vec{p_0t} \right| = \left| (x_1 - x_0)\vec{i} \right| = |x_1 - x_0|$$

$$\vec{tp_1} = (y_1 - y_0)\vec{j} \Rightarrow \left| \vec{tp_1} \right| = \left| (y_1 - y_0)\vec{j} \right| = |y_1 - y_0|$$

entonces resulta en (1)

$$\left| \vec{p_0p_1} \right| = \sqrt{(x_1 - x_0)^2 + (y_1 - y_0)^2}$$

pues  $|x_1 - x_0|^2 = (x_1 - x_0)^2$  y  $|y_1 - y_0|^2 = (y_1 - y_0)^2$

### Para resolver

1) Dado el punto  $p(-1; -1)$

a) ¿Cuál de los siguientes puntos está a menor distancia de  $p$ ?


$a(2; 5)$     $b(-2; -5)$     $c(0; 3)$     $d(1; -1)$

b) ¿Cuáles de los puntos del apartado anterior pertenecen al círculo de centro  $p$  y radio 2? Justifica analíticamente tus respuestas.



- 2) Dados  $a(2; 5)$   $b(4;1)$   $c(6; 5)$  prueba que el triángulo abc es isósceles.
- 3) Dada una circunferencia de centro  $c(4;-3)$  que pasa por el punto  $p(9; 9)$ ,
- determina la medida de su radio
  - averigua si dicha circunferencia pasa por el origen de coordenadas

### V-7- Coordenadas del punto medio de un segmento determinado por dos puntos del plano



Considerando el segmento cuyos extremos son los puntos  $p_0(x_0; y_0)$  y  $p_1(x_1; y_1)$  con  $m(x_m; y_m)$  su punto medio, resulta:

$$\vec{p_0m} = \vec{mp_1}$$

$$(x_m - x_0) \vec{i} + (y_m - y_0) \vec{j} = (x_1 - x_m) \vec{i} + (y_1 - y_m) \vec{j}$$

Aplicando la propiedad de vectores iguales en función de sus componentes se obtiene

$x_m - x_0 = x_1 - x_m$		$y_m - y_0 = y_1 - y_m$
$2x_m = x_1 + x_0$		$2y_m = y_1 + y_0$
$x_m = \frac{x_1 + x_0}{2}$		$y_m = \frac{y_1 + y_0}{2}$


$$m\left(\frac{x_1 + x_0}{2}, \frac{y_1 + y_0}{2}\right)$$

**La abscisa y la ordenada del punto medio de un segmento determinado por dos puntos de un plano son iguales a la semisuma de la abscisas y de las ordenadas respectivamente, de los extremos del segmento**

Ejemplo:

Calcula la medida de la mediana  $\overline{bm}$  del triángulo determinado por los puntos:

$$a\left(-\frac{13}{2}; 2\right) \quad b(-4; 7) \quad c(-3; 5)$$



Calcular la medida de dicha mediana es calcular la distancia entre  $b$  y  $m$ , o sea

$$d(b; m) = \sqrt{(x_m - x_b)^2 + (y_m - y_b)^2}$$

Para esto se necesita calcular las coordenadas del punto medio  $m$  del lado  $\overline{ac}$

$$\left. \begin{aligned} x_m &= \frac{x_a + x_c}{2} = \frac{\left(-\frac{13}{2}\right) + (-3)}{2} = \frac{-\frac{19}{2}}{2} = -\frac{19}{4} \\ y_m &= \frac{y_a + y_c}{2} = \frac{2 + 5}{2} = \frac{7}{2} \end{aligned} \right\} \Rightarrow m\left(-\frac{19}{4}; \frac{7}{2}\right)$$

$$d(b; m) = \sqrt{\left(-\frac{19}{4} - (-4)\right)^2 + \left(\frac{7}{2} - 7\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{-19 + 16}{4}\right)^2 + \left(\frac{7 - 14}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{205}{16}} = \frac{\sqrt{205}}{4}$$

La mediana  $\overline{bm}$  mide  $\frac{\sqrt{205}}{4}$

### Para resolver

- 1) Sabiendo que los extremos de un diámetro de una circunferencia son los puntos  $a(-2; 4)$  y  $b(4; 2)$ , determina las coordenadas del centro de dicha circunferencia y el radio de la misma.





- 2) Calcula la distancia del origen de coordenadas al punto medio del segmento cuyos extremos son:  $p_1(-2;3)$  y  $p_2(-4; 0)$
- 3) Si un extremo de un segmento es el punto  $(5; 3)$  y su punto medio es  $(8; 1)$  ¿Cuál es el otro extremo del segmento?

### VI - Operaciones con vectores en el plano.

Dados  $\alpha \in \mathbb{R}$  y en un  $\{\vec{o}; \vec{i}; \vec{j}\}$   $\vec{u} = (u_1; u_2)$   $\vec{v} = (v_1; v_2)$ , se puede probar que:

- $\vec{u} \pm \vec{v} = (u_1 \pm v_1; u_2 \pm v_2)$
- $\alpha \vec{u} = (\alpha u_1; \alpha u_2)$

Gráficamente:



### Para resolver:

1) Demuestra que dados los vectores, de componentes no nulas,

$$\vec{a} = (a_1; a_2) \text{ y } \vec{b} = (b_1; b_2) \vec{a} // \vec{b} \Leftrightarrow \frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2}$$

2) Dados en un  $\{\vec{o}; \vec{i}; \vec{j}\}$  los siguientes vectores:

$$\vec{u} = 2\vec{i} - 3\vec{j}; \quad \vec{v} = -2\vec{i} - 4\vec{j} \quad \text{y} \quad \vec{w} = \vec{i} - 7\vec{j}$$

Calcula:

- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| a) $\vec{u} + \vec{v}$ | c) $\vec{w} - \vec{u}$   |
| b) $3\vec{u}$          | d) $2\vec{u} - 5\vec{w}$ |

3) Realiza en cada uno de los siguientes casos, un gráfico- razona geoméricamente sobre el mismo y halla las coordenadas de todos los puntos:

- del semiplano de la izquierda del eje y que están a una distancia 3 del eje x y 2 del eje y.
- que están a una distancia 7 del eje x y 4 del eje y
- que están a una distancia 13 del punto (1; 0) y a una distancia 5 del eje x.

4) Halla, en cada caso, una condición algebraica que solo cumplen las coordenadas (x; y) de sus puntos:

- de la recta paralela al eje x que contiene al punto (3; 6)
- del eje y
- del semiplano de la derecha del eje y



5) Completa el cuadro

a	b	Componentes escalares de $\vec{ba}$	Expresión canónica de $\vec{ob}$	$ \vec{oa} $	dist(a;b)	Coordenadas del punto medio de $\overline{ab}$
(2;4)	(4;-2)					
(0;-2)		(4;1)				
	(4;0)					(5;-2)
(-1;1)			$-3i+7j$			

6) Dado en un sistema ortogonal  $\{o; \vec{i}; \vec{j}\}$  los siguientes vectores posición

$$\vec{op}_1 = -4\vec{i} + 4\vec{j}$$

$$\vec{op}_2 = -4\vec{i} - 3\vec{j}$$

$$\vec{op}_3 = \frac{1}{2}\vec{i} + \frac{3}{2}\vec{j}$$

- representálos gráficamente
- indica sus respectivas componentes escalares
- halla el módulo de cada uno
- indica las coordenadas de los puntos  $p_1$ ;  $p_2$  y  $p_3$

e. halla  $\vec{or} / \vec{or} = \vec{op}_1 + \vec{op}_2 + \vec{op}_3$

f. halla  $\vec{os} / \vec{or} + \vec{os} = \vec{0}$

7) Dados en un  $\{\vec{o}; \vec{i}; \vec{j}\}$  los siguientes puntos:  $a(-3; -3)$   $b(-2; 3)$  y  $c(3; -2)$

a. halla por sus componentes escalares el  $\vec{v} = 2\vec{ac} - \vec{cb}$

b. calcula el  $|\vec{v}|$

c. calcula  $|\vec{ab}| + |\vec{bc}|$  y  $|\vec{ab} + \vec{bc}|$ . Obtiene una conclusión.

d. Escribe la expresión canónica de  $\vec{oa}$  y  $\vec{ob}$

e. Obtiene la expresión canónica del versor asociado a  $\vec{ac}$

8) Halla la distancia entre los puntos  $p_1(3; -2)$  y  $p_2(7; -5)$

9) Sean  $a(2; 1)$  y  $b(5; 3)$  en un  $\{\vec{o}; \vec{i}; \vec{j}\}$ , halla:

a. la expresión canónica del  $\vec{ab}$

b. indica sus componentes escalares y vectoriales

c. halla las coordenadas del punto  $m$ , tal que

$$\vec{ma} = \frac{1}{2}\vec{ab} \text{ y } m \in \vec{ab}$$

10) Dados los vectores  $\vec{a} = (2; 1)$ ;  $\vec{b} = (-1; 4)$  y  $\vec{c} = \vec{i} - 2\vec{j}$ ,

a. halla las componentes escalares de:  $\vec{d} = \vec{a} + \frac{1}{5}\vec{b} - \frac{2}{3}\vec{c} + \vec{e}$  si  $\vec{e} = \frac{\vec{b}}{|\vec{a}|}$

b. calcula  $\vec{u} / \vec{a} - 2\vec{u} = 4\vec{u} - 2\vec{b}$

c. determina las componentes escalares de  $\vec{b}_0$



11) Si  $\vec{b} = (-1; 3)$ ;  $p(0; -1)$  y  $\vec{b} = \vec{pq}$ , calcula las coordenadas del punto  $q$ .

12) ¿Qué coordenadas debe tener el punto  $p$  para que se verifique que  $3\vec{pq} - 2\vec{qr} = \vec{0}$  siendo  $q(3; 2)$  y  $r(-1; 5)$

13) Calcula los números reales  $\alpha$  y  $\beta$  tales que:  $3(\alpha; \beta) - (2; 1) = (2\alpha; 2\beta)$

14) En un  $\{o; \vec{i}; \vec{j}\}$  grafica el triángulo rectángulo cuyos vértices son:

$$a(-1; 3) \quad b\left(\frac{3}{2}; \frac{1}{2}\right) \quad \text{y} \quad c(3; 2) .$$

d. Verifica que ese triángulo es rectángulo

e. Halla el área del  $\triangle abc$

f. Halla la medida de la mediana correspondiente a la hipotenusa

15) Dados  $a(-1; 2)$   $b(2; 5)$  y  $c(-2; 1)$  halla las coordenadas de  $r$  tal que  $\vec{cr} = 2\vec{ab}$

16) Prueba que el cuadrilátero cuyos vértices son:

$a(8; -3)$ ;  $b(6; 5)$ ;  $c(-2; 3)$  y  $d(0; -5)$ , es un rombo. ¿Puedes afirmar que es un cuadrado? ¿por qué?

17) Si  $a(1; 2)$ ;  $b(4; 0)$  y  $c(3; 5)$  son tres de los vértices de un cuadrado, halla:

a) las coordenadas del cuarto vértice

b) las coordenadas del punto de intersección de las diagonales

c) la medida de las diagonales

18) Averigua si  $a(1; 1)$ ;  $b(3; 3)$ ;  $c(5; 3)$  y  $d(1; -1)$  son los vértices de un trapecio. Explica por qué.



- 19) Demuestra que  $m$   $r$   $s$   $t$  es un paralelogramo si:  
 $m(-3; -1)$ ;  $r(-1; 3)$ ;  $s(4; 3)$  y  $t(2; -1)$  determina el punto de intersección de las diagonales y calcula la medida de ellas.
- 20) Los puntos  $a(-1; 0)$  y  $b(-1; 6)$  son los vértices de la base de un triángulo isósceles. Calcula las coordenadas del tercer vértice.
- 21) Determina si las siguientes proposiciones son V (verdaderas) o F (falsas). Justifica.

a)  $|\vec{u}| = |\vec{v}| \Rightarrow \vec{u} = \vec{v}$

b)  $\vec{w} = \left( \frac{1}{\sqrt{2}}; -\frac{1}{\sqrt{2}} \right)$  es un versor

c) El punto medio del segmento  $ab$  es  $m\left(\frac{1}{2}; 1\right)$ , siendo  $a(-1; 3)$  y  $b(2; 5)$

d) Los puntos  $p(-1; 0)$ ;  $q(0; 1)$  y  $t(2; 2)$  son vértices de un triángulo e) Si  $|\vec{v}| = 2\sqrt{3}$   $\wedge$   $|\lambda \vec{v}| = 6\sqrt{3} \Rightarrow \lambda = 3$

### PRÁCTICA COMPLEMENTARIA

- 1) Marca con una cruz la respuesta correcta:

Dados en un  $\{o; \vec{i}; \vec{j}\}$   $a(-1; 2)$ ;  $\vec{v} = (4; -3)$ ;  $\vec{oc} = 3\vec{i} - \vec{j}$  siendo

a)  $\vec{oa} + \vec{v} = \frac{1}{2}\vec{i} + 2\vec{i} - \vec{j}$  resulta

i)  $\vec{i} = 2\vec{i}$

ii)  $\vec{i} = (10; -4)$

iii)  $\vec{i} = \vec{i}$

iv) ninguna de las anteriores

b)  $\vec{am} = \vec{mc}$  es:

i)  $m\left(-2; \frac{3}{2}\right)$



ii)  $m\left(1; \frac{1}{2}\right)$

iii)  $m(-2; 1)$

iv) ninguna de las anteriores

c)  $\left| \begin{matrix} \vec{a} \\ \vec{c} \end{matrix} \right| \vec{v} = \vec{u}$  resulta

i)  $\vec{u} = 5\vec{i}$

ii)  $\vec{u} = (20; -15)$

iii)  $\vec{u} = (10; -15)$

iv) ninguna de las anteriores

d)  $\vec{t}_0$  es un versor paralelo a  $\vec{ac} + \vec{v}$  entonces

i)  $\vec{t}_0 = \left(\frac{4}{5}; -\frac{3}{5}\right)$

ii)  $\vec{t}_0 = \left(\frac{8}{\sqrt{10}}; -\frac{6}{\sqrt{10}}\right)$

iii)  $\vec{t}_0 = \left(\frac{6}{\sqrt{72}}; -\frac{6}{\sqrt{72}}\right)$

iv) ninguna de las anteriores

e)  $x = \left| \begin{matrix} \vec{a} \\ \vec{ac} + \vec{v} \end{matrix} \right|$  resulta

i)  $x = \sqrt{10}$

ii)  $x = 4$

iii)  $x = 5 + \sqrt{5}$

iv) ninguna de las anteriores

f)  $\vec{v} = \vec{od}$  resulta que

i)  $a; c$  y  $d$  están alineados

ii)  $a; c$  y  $d$  forman triángulo

iii) el punto  $d$  y el punto  $a$  coinciden

iv) ninguna de las anteriores

g)  $\vec{r} // \vec{v} \wedge |\vec{r}| = 2 \wedge \text{sent } \vec{v} \neq \text{sent } \vec{r}$  entonces

i)  $\vec{r} = \left(-\frac{8}{25}; \frac{6}{25}\right)$

ii)  $\vec{r} = \left(\frac{8}{5}; -\frac{6}{5}\right)$

iii)  $\vec{r} = \left(-\frac{8}{5}; \frac{6}{5}\right)$

iv) ninguna de las anteriores

2) Determina si las siguientes proposiciones son V (verdaderas) o F (falsas). Justifica tus respuestas

a) Dado en un  $\{o; \vec{i}; \vec{j}\}$   $\vec{oa} = (3; 3); \vec{bo} = (-2; -2); \vec{oc} = \vec{i} - \vec{j}$  y  $\vec{bd} = (3; 1)$   $abcd$  es un trapecio

b) Dados en un  $\{o; \vec{i}; \vec{j}\}$   $a\left(0; -\frac{1}{2}\right); b(4; -3); \vec{u} = -2\vec{i} + 4\vec{j} \wedge 2\vec{ab} - \vec{u} + 3\vec{x} = \vec{0}$  las componentes vectoriales de  $\vec{x}$  son  $-\frac{10}{3}\vec{i}$  y  $3\vec{j}$

c) El área del triángulo isósceles cuyos vértices son  $a(2; -2); b(-3; -1)$  y  $c(1; 6)$  es  $\frac{\sqrt{.6084}}{4}$

d) El triángulo de vértices  $a(-1; 2); b(1; 0)$  y  $c\left(\frac{15}{4}; \frac{11}{4}\right)$  es rectángulo no isósceles

e) El vector  $\vec{w} = \frac{1}{\sqrt{2}}\vec{i} + \frac{\sqrt{2}}{2}\vec{j}$  es un versor

f)  $\vec{u}$  paralelo a  $\vec{v}$   $\left. \begin{array}{l} \\ |\vec{u}| = |\vec{v}| \end{array} \right\} \Rightarrow \vec{u} = \vec{v}$

g) Si  $|\alpha \vec{u}| = 4\sqrt{2} \wedge |\vec{u}| = 2\sqrt{2}$  entonces  $\alpha = 2$



h) En el rectángulo  $abcd$  la base es el doble de su altura, entonces:


i)  $\vec{ab} = \vec{cd}$

ii)  $\vec{bc} = -\vec{da}$


iii)  $\left| \vec{cd} \right| = \frac{1}{2} \left| \vec{bc} \right|$

iv)  $\vec{bc} = 2\vec{ab}$

v)  $\vec{ad} = \vec{ab} + \vec{cd}$



3) Expresa  $\vec{u}$ ;  $\vec{v}$  y  $\vec{w}$  en función de  $\vec{a}$  y  $\vec{b}$  y/o de sus opuestos.



4) El cuadrilátero  $abcd$  está inscrito en una circunferencia de centro  $p(1;0)$ . Si se sabe que  $a(4;4)$ ;  $b(-3;3)$ ;  $c(-2;-4)$ ;  $d(5;y)$

- Calcula el radio de la circunferencia
- Determina la ordenada del punto  $d$ , siendo  $y < 0$
- ¿Es el cuadrilátero  $abcd$  un paralelogramo?. Justifica.
- Halla las coordenadas del punto  $q$  sabiendo que:

$\vec{qa} = -4\vec{cm}$  y que  $m$  es el punto medio de  $\vec{cb}$

5) Dados los vectores  $\vec{u} = (3; a)$  y  $\vec{v} = \vec{i} - 2\vec{j}$  determina  $(a; b) / 2\vec{u} - b\vec{v} = \vec{c}$  siendo  $\vec{c} = \vec{i}$

### Respuestas de la práctica complementaria

1)

	i	ii	iii	iv
a	x			
b		x		
c		x		
d	x			
e				x
f		x		
g			x	

2)

	a	b	c	d	e	f	g	h				
								i	ii	iii	iv	v
V	x	x	x	x	x				x	x		
F						x	x	x			x	x

No se presentan las justificaciones

3)  $\vec{u} = \vec{b} + \vec{a}$   
 $\vec{v} = -\vec{a} + \vec{b}$   
 $\vec{w} = \vec{b} - \vec{a}$

- 4) a)  $r = 5$   
 e)  $-3$   
 f)  $abcd$  es paralelogramo  
 g)  $q(2;18)$

5)  $a = -5$        $b = 5$

### Bibliografía

Apunte Cod 1301-12 ALGEBRA VECTORIAL- Autores varios