

# Taco de Reina

*Tropaeolum majus* L.  
TROPAEOLACEAE



## CARACTERÍSTICAS

Hojas alternas, orbiculadas, peltadas (pecíolo inserto aproximadamente en el centro del limbo), con el limbo entero o ligeramente lobulado.

Pecíolos largos, enrollados en espiral.

Nerviación retinervada, de 9 venas principales o primarias.



Flor asimétrica, el cáliz es de 5 sépalos, amarillento, más corto que la corola, prolongado hacia atrás en un espolón de 2-3 cm de largo; la corola de 5 pétalos desiguales dentados, libres, unguiculados.

Fruto tricoco, subcarnoso de 1-1,5 cm de diámetro, rugoso, indehiscente.

## SUELO Y RECOLECCIÓN

Herbácea anual que se desarrolla en el ciclo Otoño/Invierno/Primavera.  
Se propaga por Semillas.



• Cosecha: Entre julio y octubre, cuando sus hojas y flores ya están desarrolladas.

• Siembra: Marzo, abril y mayo

## ACCIONES FARMACOLÓGICAS

Las hojas poseen propiedades revitalizantes y antiescorbútics debido a su alto contenido de vitamina C.

El aceite de las semillas presenta propiedades antimicrobianas y rubefacientes.


Usos etnomedicinales: la infusión de hojas y flores se emplea como antiescorbútica, diurética, revitalizantes y para combatir afecciones del sistema respiratorio y urinario.



## DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

 NATIVA

 INTRODUCIDA



POWO.SCIENCE.KEW.ORG



Universidad  
Nacional  
de Rosario



facultad de  
ciencias  
**bioquímicas y  
farmacéuticas**



Municipalidad  
de Rosario