SHOCK SÉPTICO FULMINANTE EN PACIENTE AMBULATORIO

Traverso, Valentina; Supersaxco, Raul; Baras, Jaquelina.
1Facultad de Cs. Bioquímicas y Farmacéuticas, UNR. 2 Hospital Provincial de Rosario

CASO CLÍNICO

Paciente acude al consultorio externo de la institución para análisis prequirúrgico que no arroja resultados destacables. Horas mas tarde ingresa por guardia por síndrome febril y fallece en la madrugada. Días después se arriba al diagnostico de meningococcemia.

Externo
Sin hallazgos significativos mas allá de una leucocitosis leve a expensas de PMN

Guardia
Leve alteración de la función renal y aumento significativo de marcadores inflamatorios

UTI
Marcada alteración de la función renal, marcadores inflamatorios aun más aumentados y elevación de determinadas enzimas

Post mortem
Hemocultivo positivo para N. meningitidis. Sin marcadores de infecciones virales o inmunosupresión

ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA INVASIVA

N. meningitidis es el agente causal de enfermedades como meningitis, bacteriemia y shock séptico.



IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

DATOS ESTADÍSTICOS

En Argentina la tasa de incidencia ha disminuido, pasando de 2,6 casos cada 100.000 habitantes por año en 1993 a 0,6 casos cada 100.000 habitantes por año en el 2005.