

Instituto Politécnico

Universidad Nacional de Rosario Universidad Nacional de

Ingreso Carreras Terciarias Matemática

2016



Dpto. de Matemática

Masterización: RECURSOS PEDAGÓGICOS



Cáp. 1: LOS NÚMEROS REALES

En el conjunto de los números reales.

Es probable que el hombre primitivo, en una primera etapa del desarrollo de su capacidad de abstracción, solo haya advertido la diferencia entre la unidad y la multiplicidad.

Luego, intentando resolver problemas que la naturaleza le planteaba aprendió a “contar”. Con esto, en un origen, no muy preciso surgieron los llamados **números naturales**, al conjunto de los cuales indicamos con N y cuyos elementos escribimos bajo la representación indo-arábiga, es decir:

$$N = \{1; 2; 3; \dots\}$$

La necesidad de asignar un número al conjunto vacío dio origen al cero, surgiendo en consecuencia

$$N_0 = N \cup \{0\} = \{0; 1; 2; \dots\}$$

que es el conjunto de los **números naturales y el cero**.

Al trabajar en N_0 aparecen cuestiones que carecen de solución. Así, dados p y $q \in N$ no siempre es posible hallar $x \in N$ tal que: $q + x = p \Rightarrow x = p - q$ con $p < q$.

Para resolver esa situación aparece el conjunto de los Números Enteros que simbolizamos con Z y lo indicamos:

$$Z = \{\dots -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; \dots\}$$

Así, dados $p \in Z$ y $q \in Z - \{0\}$ no siempre es posible hallar $x \in Z$ tal que: $q \cdot x = p$, lo que surge naturalmente de no poder resolver en Z , divisiones del tipo $p : q$ cuando p no es múltiplo de q .

Para resolver esa cuestión se crean el conjunto de los **números racionales** que lo indicamos con Q y definimos como:

$$Q = \left\{ x / x = \frac{p}{q} \text{ con } p \in Z \text{ y } q \in Z - \{0\} \right\}$$

Q del inglés
quotient que
significa **cociente**

es decir en Q están los números que escribimos como “fracción” con numerador en Z y denominador en $Z - \{0\}$.

Sin embargo, no todo resulta posible en Q , surgiendo un nuevo problema cuya solución no se consigue en Q .

¿Cuál es el número x tal que $x^2 = 2$?

Como ya sabemos puede probarse que ningún número de la forma $\frac{p}{q}$ resuelve esa ecuación.

A partir de tal cuestión y con el objeto de “crear” números que la resuelvan surge

$I = \{\text{números irracionales}\}$


En I están aquellos números que no se pueden escribir en forma de “fracción”, como por ejemplo π ; $\sqrt{2}$; $\sqrt{3}$ entre otros.

Entonces, a partir de los conjuntos anteriores, resulta un nuevo conjunto, llamado conjunto de los **números reales** y simbolizado con R

$$R = Q \cup I$$

Este conjunto será nuestro objeto de estudio

En el siguiente diagrama se muestra la relación entre los conjuntos numéricos **R, Q, I, Z, N_0, N**





Actividades

1) Indica si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas, justifica tu respuesta.

a) 0 es un número racional

b) $\mathbb{R}^+ \cup \mathbb{R}^- = \mathbb{R}$

c) Todo número real no racional es irracional.

d) $\frac{8}{2}$ no es natural.

e) $\frac{a}{a} = 1$

f) Existen números reales tales que su cuadrado es igual a 12

g) $-3,5$ es irracional

h) $x \in \mathbb{Q} \Rightarrow x \in \mathbb{R}$

i) La medida de la diagonal de un rectángulo de lados 3 y 4 es un número racional

2) ¿Cuál de las siguientes expresiones es falsa? ¿Por qué?

a) La medida de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es siempre irracional.

b) Existe un cuadrado de área 2 cuyo lado sea un número racional.

c) $0 \in (\mathbb{I} \cap \mathbb{Q})$


d) Todo número racional es un número real.

Propiedades de las operaciones con los números reales

Suma y multiplicación

En $\mathbb{R}$ la suma y la multiplicación gozan de las siguientes propiedades. Consideramos

$\forall a; b; c \in \mathbb{R}$



Resta

Definición:

$$\forall a; b; c \in \mathbb{R} \quad a - b = c \Leftrightarrow a = b + c$$

Algoritmo de la resta

$$c = a + (-b)$$



División

Definición

$$\forall a; b \in \mathbb{R} ; b \neq 0 \quad a : b = c \Leftrightarrow a = b \cdot c$$

Algoritmo de la división

$$c = a \cdot \frac{1}{b} \quad b \neq 0$$

Actividad

3) Indica en cada caso si la igualdad dada es correcta o incorrecta.

a) $6 + 4 : 2 = (6 + 4) : 2$

b) $6 : 2 + 4 : 2 = (6 + 4) : 2$


c) $(2 + 3)^2 = 2^2 + 3^2$

Representación en eje real

Existe una correspondencia biunívoca entre los números reales y los puntos de una recta en la que se haya fijado un origen y una unidad de medida (eje real)

- A cada número real corresponde un punto del eje real y recíprocamente a cada punto del eje real le corresponde un número real.

Así:



- Decimos que a $\sqrt{5}$ corresponde A o que a le A corresponde $\sqrt{5}$, escribimos A ($\sqrt{5}$) y leemos A tiene por **abscisa** $\sqrt{5}$


Valor absoluto de un número real

Llamamos **valor absoluto** de un número real x y simbolizamos $|x|$, a la distancia de ese número al origen en el eje real.

Es decir

$$x \in \mathbb{R}, |x| = d(x; 0)$$

Obviamente de esta definición surge que existen dos números cuyas distancias al origen es la misma: **el número y su opuesto**



Podemos decir que:

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Conjunto Z de los números enteros es:

$$x \in Z \Leftrightarrow |x| \in N_0$$

Expresión decimal de un número real

Todo número real tiene una forma decimal de representación que se diferencia según sea un número racional o un número irracional.

- La expresión decimal de su número racional tiene infinitas cifras decimales “periódicas”.

Por ejemplo:

$$\frac{4}{3} = 1,333... = 1,\bar{3}$$

$$\frac{5}{2} = 2,5000... = 2,5\bar{0} = 2,5$$

- La expresión decimal de un número irracional tiene infinitas cifras decimales “no periódicas”


- $\pi = 3,141592...$
- $1.23456...$
- $-\sqrt{2} = -1,414213...$

Relación de orden

Decimos que un número real es menor o igual que otro si el punto representativo del primero en el eje real, se encuentra a la izquierda o coincide con el punto representativo del segundo.



Así:



$a \leq b$ y leemos a es menor o igual que b

Naturalmente: $a \leq b \Rightarrow b \geq a$

Los intervalos son subconjuntos de números reales. Se representan gráficamente de la siguiente forma

➤ Intervalos acotados

Nombre	Notación	Conjunto	Representación gráfica
Intervalo cerrado	$[a ; b]$	$\{x/ a \leq x \leq b\}$	
Intervalo abierto	$(a ; b)$	$\{x/ a < x < b\}$	
Intervalos semiabiertos ó semicerrados	$[a ; b)$	$\{x/ a \leq x < b\}$	
	$(a ; b]$	$\{x/ a < x \leq b\}$	

➤ Intervalos no acotados

Nombre	Notación	Conjunto	Representación gráfica
Superiormente	$[a ; +\infty)$	$\{x / x \geq a \}$	
	$(a ; +\infty)$	$\{x / x > a \}$	
Inferiormente	$(-\infty ; a]$	$\{x / x \leq a \}$	
	$(-\infty ; a)$	$\{x / x < a \}$	

Actividades

4) Te informan que $a \cdot b = a$. ¿Cuáles son los valores posibles de a y de b ?

5) $a \cdot b = 0$, $a + b = 8$, $b \neq 0$. Calcula a y b .

6) Completa las siguientes implicaciones.

$$\text{i) } \left. \begin{array}{l} xy > 0 \\ y > 0 \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$\text{iv) } \left. \begin{array}{l} x + y < 0 \\ x > 0 \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$\text{ii) } \left. \begin{array}{l} xy < 0 \\ y < 0 \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$\text{v) } \left. \begin{array}{l} x + y > 0 \\ y < 0 \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$\text{iii) } xy < 0 \Rightarrow$$

$$\text{vi) } x + y = 0 \Rightarrow$$

7) Enuncia coloquialmente las siguientes propiedades y ejemplifica.

$$\text{i) } -a = (-1)a$$

$$\text{ii) } -(a+b) = (-a) + (-b)$$

$$\text{iii) } -(-a) = a$$

$$\text{iv) } (-a)(-b) = ab$$

$$\text{vi) } \frac{1}{\frac{1}{a}} = a; \forall a \neq 0$$

$$\text{v) } \forall a \neq 0; \forall b \neq 0; \frac{1}{ab} = \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{b}$$

$$\text{vi) } \frac{-a}{b} = \frac{a}{-b} = -\frac{a}{b}; \forall b \neq 0$$



8) Establece si cada una de las siguientes afirmaciones es **verdadera** o **falsa**, justificando tu respuesta

a) Todo número real tiene un recíproco

b) El recíproco de $\left(-\frac{2}{5}\right)$ es $\left(-\frac{5}{2}\right)$

c) El opuesto de 5 es $\frac{1}{5}$

d) $2.(a.b) = (2a).(2b)$

e) $-x + y = y - x$

f) $\frac{x+2}{2} = \frac{x}{2} + 1$

g) $\frac{4}{2}$ no es un entero positivo

h) Todo entero es positivo o negativo

i) Existe un número real x tal que $x^2 + 1 = 0$

j) Existe más de un número real que verifica $x^2 - 4 = 0$

k) Si $|x| = 2,5 \Rightarrow x = 2,5$

9) Expresa algebraicamente y halla el valor numérico de la expresión que se obtenga para

$$a = \frac{1}{2}; \quad b = 0; \quad c = \frac{3}{4}$$

i. A la mitad del cuadrado de a sumarle un tercio de la suma de b y c

ii. A la suma de a y c multiplicarla por el cuadrado de a .

iii. A un cuarto de b sumarle $\frac{1}{3}$ del quíntuplo de b .

10) Se sabe que a es un número real que verifica $a \leq (-2)$. ¿Qué números del conjunto dado están representados por a ? Márcalos con una cruz.

$$\left\{-3; \sqrt{2}; -0,5; \frac{1}{3}; -\frac{5}{2}; -2; -1,5; -100\right\}$$

11) Representa en sucesivos ejes reales el conjunto de valores de la variable que hace cierta cada proposición:

a) $x < (-2)$

b) $x \geq (-2)$

c) $x \geq \frac{2}{3}$

d) $x < 0$

e) $(-1) < x < 1$

f) $(-2) \leq x \leq \left(+\frac{3}{2}\right)$






g) $(-1,5) \leq x < (-0,5)$

Observación:

En R se mantiene la definición de la relación “entre” o sea:
dados a, b y $c \in R$ $a < b$
 c está **entre** a y b
si $a < c$ y $c < b$
Notamos:

$$a < c < b$$

12) Escribe utilizando desigualdades, el conjunto de números representado en cada eje



13) Representa en el eje real posibles números a , b , y c que verifiquen simultáneamente las condiciones indicadas en cada caso.



- a) $a \not> b$ y $c > b$
- b) $c > a$ y $a \leq b$
- c) $0 < a \leq b$ y $c < 0$

14) ¿Verdadero o falso? Justifica tu respuesta

- a) a es un punto de abscisa positiva, entonces su simétrico respecto de $c(1)$ posee abscisa negativa
- b) $a \leq b, \quad b \leq a \Rightarrow a = b$
- c) $a \geq b, \quad a < 0 \Rightarrow b < 0$
- d) $a \leq b \leq c, \quad c < 0 \Rightarrow a < 0$

15) i) Determina cuál es el signo ($<$; $>$ ó $=$) que corresponde colocar entre los siguientes pares de números

- a) $|-8| \dots\dots\dots |3|$
- b) $|8| \dots\dots\dots |-3|$
- c) $|2,5| \dots\dots\dots |-2,5|$
- d) $|-2| \dots\dots\dots |-4|$

16) Completa con las palabras: **es mayor que** o **es menor que** según corresponda

- $a > 0 \wedge b > 0 \wedge |a| > |b| \Rightarrow a \dots\dots\dots b$

En palabras:

De dos números positivos, el que tiene mayor valor absoluto que el que tiene menor valor absoluto

- $a < 0 \wedge b < 0 \wedge |a| > |b| \Rightarrow a \dots\dots\dots b$

En palabras:

De dos números negativos, el que tiene mayor valor absoluto..... que el que tiene menor valor absoluto

17) Responde:

a) ¿Cuál o cuales son los números cuya distancia al origen es 1,378?

b) ¿Cuál o cuales son los números cuyo valor absoluto es $\sqrt{2}$?

18) Escribe cada una de la siguientes expresiones en términos de distancia y representa en el eje real los números x que la verifican:

a) $|x| = \frac{3}{2}$

b) $|x| \leq 2$

c) $|x| < 2,5$

d) $|x| \geq \frac{3}{2}$



e) $|x| > \frac{9}{4}$

f) $|x| > 0$

g) $x \in \mathbb{Z}$ y $|x| < 5$


h) $x \in \mathbb{Z}$ y $2 < |x| \leq 5$

19) Empleando la simbología de valor absoluto escribe la igualdad o la desigualdad que verifican los números x representados en cada eje real.






c)



d)



Potenciación

Es importante notar que la potenciación expresa una multiplicación de factores iguales.

Por ejemplo productos del tipo:

$$5 \cdot 5 \cdot 5; \quad 3 \times 3 \times 3 \times 3; \quad 0 \times 0 \times 0 \times 0 \times 0$$

se expresan respectivamente

$$5^3; \quad 3^4; \quad 0^5$$

en los que suele llamarse **base** al factor que se multiplica reiteradamente y **exponente** al número de veces que se multiplica ese factor.

Sin embargo, es necesario plantear una definición que involucre todas las situaciones que pueden darse cuando la base es un número real cualquiera y el exponente un entero cualquiera.

$$a^n = \begin{cases} \overbrace{a \cdot a \cdot a \dots a}^{n \text{ factores}} & \text{si } n > 1; n \in \mathbb{N} \\ a & \text{si } n = 1 \\ 1 & \text{si } n = 0; a \neq 0 \\ \frac{1}{a^n} & \text{si } n < 0; n \in \mathbb{Z}; a \neq 0 \end{cases}$$

Son ejemplos de potencias:

- $(-2)^5 = (-2)(-2)(-2)(-2)(-2) = -32$
- $(-\sqrt{2})^0 = 1$

- $\left(\frac{3}{5}\right)^{-3} = \left(\frac{5}{3}\right)^3 = \frac{125}{27}$
- $1^{40} = 1$

La potenciación goza de propiedades que pueden demostrarse a partir de la definición propuesta y que son:

a) Propiedad distributiva de la potenciación

- $(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$
- $(a : b)^n = a^n : b^n; b \neq 0$

b) Producto de potencias de igual base

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$$

c) Cociente de potencias de igual base

$$a^n : a^m = a^{n-m}; a \neq 0$$

d) Potencia de otra potencia

$$(a^n)^m = a^{n \cdot m}$$

Cuadrados perfectos

El cuadrado de un número natural es otro número natural llamado "cuadrado perfecto". Así, por ejemplo, son cuadrados perfectos:

16; 25; 144

↓ ↓ ↓

4^2 5^2 12^2

- Te proponemos como problema probar alguna de ellas.

La potenciación resulta un instrumento muy útil para escribir números muy grandes o muy pequeños

Tales como por ejemplo:

- el volumen aproximado de los océanos que se estima en 1 300 000 000 000 000 000 de litros
- el radio de un electrón que se estima en 0,000 000 000 000 004 m

Para poder expresar con facilidad números de esta naturaleza resulta útil la potencia ya que permite introducir lo que llamamos **notación científica** y que consiste en escribir cualquier número de la forma

$$x = a \cdot 10^n; \text{ con } 1 \leq a < 10 \text{ y } n \text{ entero}$$

Para los ejemplos anteriores resulta que



✓ $1\,300\,000\,000\,000\,000\,000 = 1,3 \cdot 10^{18}$

✓ $0,000\,000\,000\,000\,004 = 4 \cdot 10^{-15}$

Problemas

20) Calcula cada valor para $n = 1$; 3 y (-3)

a) $\left(n + \frac{1}{n}\right)^n$

b) $(n^2 - n + 1)^2$

c) $4^{\frac{3}{n}}$

d) $\left|\frac{1}{n}\right|^{n-3}$

21) Calcula expresando el resultado en la forma que muestra el ejemplo

Ejemplo: $\frac{3^3 b^2 c}{a^5 b^3 c^2} = 3^3 a^{-5} b^{-1} c^{-1}$

a) $\left(\frac{8x^{-2}y^{-2}z}{-x^4y^{-4}z^3}\right)^{-1}$

b) $\frac{2^0}{(2^{-2}x^2y^{-2})^3}$

c) $\frac{(m^0)^3 3^5 c^5}{m^2 (-3)^0 (c^2)^3}$

d) $\frac{1}{\left(\frac{\sqrt{2} x^{-2}}{\sqrt{16} x^3}\right)^2}$

e) $\frac{0,05m^4x^{-2}}{10^2(m^{-2})^2(x^{-1})^2}$

$$f) \frac{(x^2)^3}{x^4} : \left[\frac{x^3}{(x^3)^2} \right]^2$$

$$g) \frac{10^4 \cdot 10^2 \cdot 0,003}{(10^2)^2 \cdot 3}$$

$$h) \left\{ (a^{-1}b^{-2}) : (a^{-1}b) \right\}^2 : (a^{-1}b^0)^{-2}$$

22) Expresa los enunciados dados mediante símbolos y halla su valor numérico para

$$n = -2; \quad m = -1$$

- El duplo del cuadrado del número n
- El cubo de la diferencia entre m y n.
- La suma de los cuadrados de n y m
- El cuadrado de la suma de n y m
- La diferencia de los cubos de n y m
- El cubo de la diferencia entre n y m.

23) Simplifica las siguientes expresiones

$$a) \left[\frac{(a^{-2}b^{-3})^2 : (a^{-1}b^{-2})}{a^3b^4} \right] : (a^{-2}b) \qquad b) \left(\frac{x^{-2}y}{3} + \frac{1}{x^2y^{-1}} \right) (x^{-2}y)^{-1}$$

24) Establezca la veracidad o falsedad de cada enunciado, justificando la respuesta.

- a) $(-x)^2 = -x^2$
- b) $-x^2 > 0$; cualquiera se a x
- c) $(x-2)^2 = 4 \Rightarrow x = 6$
- d) $(x-1)^{-3} = \frac{1}{27} \Rightarrow x = -2$

25) Expresa en notación científica

$$a) 2\,735\,000\,000$$



b) 0,000 5691

c) $0,0521 \cdot 10^5$

26) Reduce a cm expresando el resultado en notación científica

a) 0,5 terámetro (1 terámetro es igual a 1 000 000 000 000m)

b) $7,8 \cdot 10^2$ mm

c) $2,6 \cdot 10^3$ picómetro (1 picómetro es igual a 0,000 000 000 001m)

Radicación

Ya hemos visto el significado de la expresión $a = b^n$ para distintos valores de b y n .

A partir de esta cuestión introducimos un nuevo concepto que llamamos **radicación** en el que también debemos considerar las diversas situaciones según los valores de a ; b y n .

Se define:

$$\sqrt[n]{a} = b \Leftrightarrow b^n = a \quad \text{con } n \in \mathbb{N} \text{ y } n > 1$$

- si n es par, $a \geq 0$ existen dos posibles b reales
- si n impar siempre existe un b real

Para tener en cuenta:
 a se llama **radicando** y
 n se llama **índice** y
 siempre es un número natural distinto de 1

Ejemplos:

- $\sqrt[3]{-27} = -3$ pues $(-3)^3 = -27$
- $\sqrt[4]{16} = 2$ o $\sqrt[4]{16} = -2$ ya que $2^4 = (-2)^4 = 16$

Observemos que siempre que n representa un número par y a sea un número de $\mathbb{R}^+$, existirán dos valores posibles de b que satisfagan la ecuación planteada.

Así,

$$\sqrt{144} = 12 \quad \text{o} \quad \sqrt{144} = -12 \quad \text{ya que } 12^2 = (-12)^2 = 144$$

Si el índice es 2 se omite su escritura

$$\sqrt[2]{a} = \sqrt{a}$$

El símbolo $\sqrt{a}$ se lee raíz cuadrada de a

y $\sqrt[3]{b}$ se lee raíz cúbica de b .

En los cálculos numéricos se conviene que cuando la raíz tiene un índice par, el radicando deberá ser no negativo y de sus dos posibles soluciones sólo se considera la positiva. A estos radicales se los llama radicales aritméticos

Así,

- $\sqrt[3]{-8} + \sqrt{25} = -2 + 5 = 3$
- $\sqrt[4]{16} + \sqrt[3]{-27} = 2 + (-3) = -1$

Propiedades de los radicales aritméticos

- a) $(\sqrt[n]{a})^n = a$
- b) $\sqrt[n]{a^n} = a$
- c) $\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$ Propiedad distributiva de la radicación en la multiplicación
- d) $\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$; $b \neq 0$ Propiedad distributiva de la radicación en la división
- e) $\sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$
- f) $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[m \cdot n]{a}$ Propiedad raíz de otra raíz

Potenciación de exponente racional

Definición

$n \in \mathbb{N}; n > 1$ y $m \in \mathbb{Z} \wedge a \neq 0$: $a^{\frac{m}{n}}$ se define como

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

Ejemplos:

- $(-32)^{\frac{2}{5}} = \sqrt[5]{(-32)^2}$
- $\left(-\frac{1}{8}\right)^{-\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{\left(-\frac{1}{8}\right)^{-1}}$



- $(25)^{\frac{3}{2}} = \sqrt{25^3}$

Las propiedades de la potenciación enunciadas anteriormente son válidas para la potenciación de exponente racional.

Actividades

27) Calcula

a) $\sqrt{49} \cdot 2^2 - \{(-3) \cdot 5 - (2 \cdot 3)^2\}$

b) $\sqrt{25-9} - 3(3^2 - 10)$

c) $\left(\sqrt{\frac{1}{4}} - \sqrt{\frac{1}{9}}\right) - [-2 + 2 \cdot (-5 + 8)]$

28) Indica qué valores debe asumir la variable para que cada una de las expresiones dadas quede definida en el conjunto de los números reales

a) $\sqrt{\frac{1}{x-4}}$

b) $\sqrt[5]{xy}$

c) $\sqrt{xy}$

d) $\sqrt[3]{\frac{1}{xy^2}}$

e) $\sqrt{\frac{x-2}{3}}$

f) $\sqrt{\frac{-3}{x}}$

29) Demuestra, aplicando las propiedades, cada una de las siguientes igualdades.

a) $2\sqrt{2} + \sqrt{2} + \sqrt{2} = 4\sqrt{2}$

b) $\sqrt{250} - \sqrt{50} + \sqrt{450} = 5\sqrt{10} + 10\sqrt{2}$

$\sqrt{45} - \sqrt{20} - \sqrt{80} + \sqrt{180} = 3\sqrt{5}$

c) $\sqrt{a^5b} + \sqrt{ab^5} = (a^2 + b^2)\sqrt{ab}$

Radicales semejantes

Dos radicales son semejantes si tienen igual índice e igual radicando

$$d) \sqrt{18} + \sqrt{8} + \sqrt{98} = 12\sqrt{2}$$

$$e) 6\sqrt{2} - 5\sqrt{2} + \frac{3}{4}\sqrt{2} = \frac{7}{4}\sqrt{2}$$

$$f) \sqrt[7]{0,001.b^2} \sqrt[7]{\frac{1}{10000}.b^5} = \frac{b}{10}$$

$$g) \frac{\sqrt{\left(1+\frac{5}{4}\right)a} \sqrt{169-144}}{\sqrt{a}} = \frac{15}{2}$$

$$h) \frac{\sqrt{x} - 2\sqrt{x^3}}{\sqrt{x}} = 1 - 2x$$

$$i) 7\sqrt{a^3} + b\sqrt{a} - x\sqrt{4a} = \sqrt{a}(7a + b - 2x)$$

$$j) \sqrt[3]{27a + 54b} = 3\sqrt[3]{a + 2b}$$

$$k) (a-b) \cdot \sqrt{(a-b)^{-1}} = \sqrt{a-b}$$

$$l) \frac{\sqrt{8}\sqrt{2}}{\sqrt{a}\sqrt{a^2}} = \frac{4\sqrt{a}}{a^2}$$

$$m) \sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

$$n) \sqrt[7]{\frac{2b}{b^3c^2x}} = \frac{\sqrt[7]{2b^5c^5x^6}}{bcx}$$

$$o) \sqrt[3]{7a} \cdot \sqrt{2a} \cdot \sqrt[6]{3a} = a \sqrt[6]{1176}$$

$$p) \frac{2\sqrt{a^2b}}{-\sqrt[3]{3ab}} = -2 \sqrt[6]{\frac{a^4b}{9}}$$

$$q) \frac{1}{\sqrt{x} - \sqrt{y}} = \frac{\sqrt{x} + \sqrt{y}}{x - y}$$

Racionalización de denominadores

Racionalizar un denominador es encontrar una expresión equivalente a la dada sin radicales en el denominador

Caso 1

$$a) \frac{3}{\sqrt{5}} = \frac{3}{\sqrt{5}} \cdot \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{(\sqrt{5})^2} = \frac{3\sqrt{5}}{5}$$

$$b) \frac{4}{\sqrt[3]{2a^2}} = \frac{4}{\sqrt[3]{2a^2}} \cdot \frac{\sqrt[3]{2^2a}}{\sqrt[3]{2^2a}} = \frac{4 \cdot \sqrt[3]{2^2a}}{\sqrt[3]{2^3a^3}} = \frac{2 \cdot \sqrt[3]{4a}}{a}$$

Caso 2

$$\frac{6}{\sqrt{5}+1} = \frac{6}{(\sqrt{5}+1)} \cdot \frac{\sqrt{5}-1}{(\sqrt{5}-1)} = \frac{6(\sqrt{5}-1)}{(\sqrt{5})^2-1} = \frac{3(\sqrt{5}-1)}{2}$$

Recuerda $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$



$$r) \sqrt{3} - \sqrt{12x} - \sqrt{27b^2} = \sqrt{3} \cdot (1 - 2\sqrt{x} - 3b)$$

$$s) \sqrt[3]{27b^3y^6a} = 3by^2 \sqrt[3]{a}$$

$$t) \frac{a}{b} \sqrt[3]{\frac{2b}{a}} = \sqrt[3]{\frac{2a^2}{b^2}}$$

$$u) \frac{\sqrt[3]{m^2n} \cdot \sqrt[4]{2mn}}{m \cdot \sqrt{am}} = \sqrt[12]{\frac{8n^7}{a^6m^7}}$$

30) Determina si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. Justifica

$$a) \frac{a^{\frac{4}{5}} \cdot \sqrt[5]{a^2}}{\sqrt[4]{a^{-1}}} = a^{\frac{13}{20}}$$

$$b) \left[\frac{\left(a^{\frac{2}{3}} \right)^{-\frac{1}{5}} \cdot \sqrt[3]{a^2}}{a^{\frac{1}{2}}} \right]^{\frac{1}{2}} = a^{\frac{31}{60}}$$

$$c) \left[\frac{25x^{-2}y^{\frac{1}{3}}}{64(x^{-1})^{\frac{2}{3}}} \right]^{\frac{1}{2}} = \frac{5}{8} \sqrt[6]{x^{-4}y}$$

$$d) \left[\frac{x^{3a-2}}{x^{2a-1}} \right]^{\frac{1}{a-3}} = x$$

$$e) \left[\frac{y^{b+2x}}{y^{2x}} \right]^{\frac{b+c}{b}} : y^{b+c} = 1$$

31) En cada uno de los siguientes casos calcula valores de x, y, z que verifiquen la igualdad

$$a) \sqrt[5]{ab^2} \sqrt{c} = a^x b^y c^z$$

$$b) \frac{\sqrt{2b^3}\sqrt[5]{b}}{\sqrt[4]{a^3}} = 2^x a^y b^z$$

$$c) \sqrt{\frac{a^{-\frac{1}{2}}b^{\frac{2}{3}}}{3\sqrt{b}}} = 3^x a^y b^z$$

$$d) (63a)^{\frac{1}{2}} + \sqrt{28a} = 5^x 7^y a^z$$

EXPRESIONES ALGEBRAICAS

LENGUAJE :

- COLOQUIAL
- SIMBÓLICO o ALGEBRAICO
- GRÁFICO

En Matemática una misma idea puede expresarse empleando diversas formas del lenguaje.

Por ejemplo, en lenguaje coloquial la siguiente situación:

“la suma del opuesto de un número y tres cuartos del mismo”

se expresa en el lenguaje simbólico

$$-x + \frac{3}{4}x$$

Lo que escribiste es una **expresión algebraica en x**, donde la letra x, llamada **variable** de la expresión, indica **un número cualquiera**.

Observemos, en la tabla, que el valor de la expresión: $-x + \frac{3}{4}x$ depende del valor de

la variable. A cada valor encontrado se lo denomina valor numérico de la expresión algebraica.

Valor numérico de x	Valor numérico de la expresión algebraica $-x + \frac{3}{4}x$
0	$0 + \frac{3}{4} \cdot 0 = 0$
-1	$-(-1) + \frac{3}{4}(-1) = \frac{1}{4}$
$\sqrt{2}$	$-\sqrt{2} + \frac{3}{4} \cdot \sqrt{2} = -\frac{1}{4}\sqrt{2}$

32) Completa de modo que la igualdad resulte cierta



$$a) 3x^2ya = \left(\frac{7}{3}xy\right) \cdot \left(\dots\dots\dots\right)$$

$$b) \frac{1}{4}a^2b^2c = (bc) \cdot (\dots\dots\dots)$$

$$c) (4ax) \cdot \left(\frac{3}{5}abx\right) = (\dots\dots\dots)$$

$$d) (-5mp) \cdot (\dots\dots\dots) = \frac{1}{3}mp^2$$

33) Transforma los productos en sumas indicadas.

$$a) (-4)a \left(2bc + \frac{1}{8}ab\right)$$

$$b) (-3)ax \left[\left(-\frac{2}{3}\right)x + (-1)ax \right]$$

$$c) [a + (-3)bc][(-2)b + (-3)]$$

$$d) \left[\left(-\frac{1}{3}\right)p \right] [3 + (-2)p] [p^2q + (-3)]$$

$$e) (-2z) \cdot (zb - x)$$

$$f) (1 - 2b) \cdot (-b + 4)$$

$$g) (1 - x) \cdot (x + 2)$$

$$h) 3x \cdot (1 - x)(2 + x)$$

Productos Especiales

- **Cuadrado de un Binomio**

$$(a + b)^2 = (a + b)(a + b) = \underbrace{a^2 + 2ab + b^2}_{\text{Trinomio cuadrado perfecto}}$$

- **Cuatrinomio cubo perfecto**

$$(a + b)^3 = (a + b)(a + b)(a + b) = \underbrace{a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3}_{\text{Cuatinomio cubo perfecto}}$$

- **Producto de la suma por la diferencia**

$$(a + b)(a - b) = \underbrace{a^2 - b^2}_{\text{Diferencia de cuadrados}}$$

34) Obtiene la mínima expresión:

$$a) 2m \left(\frac{9}{2}m - 1 \right) + (-2)^{-2} - \left(3m + \frac{1}{2} \right)^2 =$$

$$b) (2x - 1)^2 - \left(-\frac{1}{4x} \right)^{-1} =$$

$$c) \left(\frac{1}{a + b} \right)^{-2} - (a - b)(a + b) =$$

$$d) [5 - 3xy]^3 - x^2(y^2 - xy^3) =$$

$$e) (1 - 2b)^2 - (-b + 4)^3 =$$

Factoreo: transforma una suma algebraica en una multiplicación

a) Factor común

Ejemplo:

$$a) a^2b + a^2 + a^3 = a^2 \cdot (b + 1 + a)$$

$$b) (a - \sqrt{2})b + (a - \sqrt{2})b^2 + (a - \sqrt{2})2 = (a - \sqrt{2})(b + b^2 + 2)$$

b) Diferencia de cuadrados

Ejemplos:

$$a) 4x^2 - y^2 = (2x - y)(2x + y)$$

$$b) (2a - 1)^2 - b^2 = (2a - 1 - b)(2a - 1 + b)$$

c) Trinomio cuadrado perfecto

Ejemplos:

$$a) x^2 + 8x + 16 = (x + 4)^2$$

$$b) a^2 - 4ab^2 + 4b^4 = [a + (-2)b^2]^2 = (a - 2b^2)^2$$

d) Cuatrinomio cubo perfecto

Ejemplos:

$$a) x^3 + x^2 + \frac{1}{3}x + \frac{1}{27} = \left(x + \frac{1}{3}\right)^3$$

$$b) 8 - n^3 - 12n + 6n^2 = [2 + (-n)]^3 = (2 - n)^3$$

e) Factor común por grupos

$$a) x^2 + 2xy + x + 2y = (x^2 + x) + (2xy + 2y) = x(x + 1) + 2y(x + 1) = (x + 1)(x + 2y)$$

$$b) 4x - 2xy + 3y - 6 = (4x - 2xy) + (3y - 6) = 2x(2 - y) - 3(2 - y) = (2 - y)(2x - 3)$$

f) Factoreo combinados

Ejemplos



$$\begin{aligned} \text{a)} \quad & -\frac{1}{16} - x^4 + \frac{1}{2}x^2 = -\frac{1}{16} - x^4 + \frac{1}{2}x^2 = (-1)\left(\frac{1}{16} + x^4 - \frac{1}{2}x^2\right) = (-1)\left(\frac{1}{4} - x^2\right)^2 \\ \text{b)} \quad & 2x^4 - 162y^4 = 2(x^4 - 81y^4) = 2(x^2 - 9y^2)(x^2 + 9y^2) = 2(x - 3y)(x + 3y)(x^2 + 9y^2) \end{aligned}$$

35) Factorea todo lo posible

a) $4a^4 - 8a^2 + 4$

b) $a^2b + 2ab + b$

a) $3x^2 - 12xy + 12y^2$

b) $6a^3b^3 - 24ab$

e) $5x^2 - 10xy + 5y^2$

f) $3x^9y^7 - 12x^7y^9$

g) $ax^2 - a + x^2 - 1$

h) $16x^3 - 24x^2y + 12xy^2 - 2y^3$

i) $36a^2x + 24abx + 4b^2x$

c) $9x^3 - 9x^2y - 6x^2 + 6xy + x - y$

d) $\frac{1}{2}a^3x^2 - \frac{1}{8}a^3y^2 - \frac{1}{2}ax^2 + \frac{1}{8}ay^2$

e) $a^3 - a^2 - a + 1$

Cáp. 2: ECUACIONES

Comenzaremos recordando el concepto de “ecuación” en una incógnita o variable que se ha trabajado en diferentes cursos de Matemática:

Llamamos ecuación en una variable a toda igualdad condicionada al valor o valores que asuma la incógnita

Así, por ejemplo son ecuaciones en una incógnita :

$$x^2 - 4 = 0 \quad \text{que se verifica si } x = 2 \text{ o } x = -2$$

$$3x - 1 = 0 \quad \text{que se verifica para } x = \frac{1}{3}$$

$$2(x+1) = 2x + 2 \text{ que se verifica para cualquier valor de la incógnita (es una identidad)}$$

En general una igualdad del tipo: $ax+b = 0$ constituye una ecuación que contiene a la incógnita x .

Resolver una ecuación es hallar el o los valores numéricos para la incógnita que la verifican. Ese conjunto de números que satisfacen una ecuación se denomina **conjunto solución**.

Así, solución de la ecuación: $16 \cdot 2^{x-1} = 1$ es $x = -3$, pues $16 \cdot 2^{-4} = 16 \cdot \frac{1}{16} = 1$, entonces, el conjunto

solución es

$$S = \{-3\}$$

Para resolver las ecuaciones se emplean generalmente un método que está basado en la obtención de ecuaciones equivalentes, a través de la aplicación de sucesivas transformaciones.

Tener presente que

“Dos ecuaciones son equivalentes si admiten el mismo conjunto solución”

De esta forma la ecuación inicial se transforma en ecuaciones equivalentes hasta lograr una ecuación en la que en forma inmediata se pueda obtener la solución.

Para ello es preciso tener presente las siguientes propiedades:



- Sumando a ambos miembros de una ecuación una misma “expresión” se obtiene una ecuación equivalente a la dada
- Multiplicando a ambos miembros de una ecuación por un mismo número distinto de cero se obtiene una ecuación equivalente.

☞ Resolvamos las siguientes ecuaciones

a) $\frac{x+7}{6} + \frac{2x-8}{-2} = -4$

efectuemos la suma de fracciones

$$\frac{-10x+62}{12} = -4$$

multiplicando a ambos miembros de la ecuación por 12 se obtiene una ecuación **equivalente**

$$-10x + 62 = -48$$

sumando a ambos miembros de la ecuación (-62) se obtiene una ecuación **equivalente**

$$-10x = -110$$

dividiendo a ambos miembros de la ecuación por (-10) se obtiene una ecuación **equivalente**

$$x = 11$$

es una solución de la ecuación planteada pues dicho valor la verifica por lo tanto

$$S = \{11\}$$

b) $\sqrt{x} + \sqrt{x+2} = 3$

elevando al cuadrado a ambos miembros

$$x + x + 2 + 2\sqrt{x(x+2)} = 9$$

$$2\sqrt{x(x+2)} = 7 - 2x$$

elevando al cuadrado a ambos miembros

Puede ocurrir que esta ecuación no sea equivalente a la dada ya que la estrategia aplicada de elevar al cuadrado a ambos miembros, no cumple con las propiedades de ecuaciones equivalentes

$$4x(x+2) = 49 + 4x^2 - 28x$$

aplicando propiedad distributiva del producto respecto de la suma

$$4x^2 + 8x = 49 + 4x^2 - 28x$$

$$36x = 49$$

$$x = \frac{49}{36}$$

Verificamos la solución obtenida en la ecuación original:

$$\sqrt{\frac{49}{36}} + \sqrt{\frac{49}{36}} + 2 = \frac{7}{6} + \frac{11}{6} = \frac{18}{6} = 3$$

luego $x = \frac{49}{36}$ es solución de la ecuación dada. $S = \left\{ \frac{49}{36} \right\}$

c) $\sqrt{x-3} - 2 = \sqrt{x}$

$$x - 3 + 4 - 4\sqrt{x-3} = x \quad \text{¿Es equivalente a la ecuación original?}$$

$$-4\sqrt{x-3} = -1$$

$$16(x-3) = 1$$

$$x = \frac{49}{16}$$

Verificando:

$$\sqrt{\frac{49}{16}} - 3 - 2 \neq \sqrt{\frac{49}{16}}, \text{ o sea que } x = \frac{49}{16} \text{ no es solución de la ecuación planteada.}$$

Por lo tanto la ecuación planteada no tiene solución $S = \{ \} = \Phi$



Problemas

1) Resuelve las siguientes ecuaciones

a) $(3x - 2) - (x + 3) = 8$

e) $\sqrt{2x + 5} - 1 = 3$

b) $2(x - 3) - 3(4x - 5) = 17 - 8x$

f) $\sqrt{y + 6} = 3$

c) $\frac{1}{2}x - 3 \cdot \left(x + \frac{1}{3}\right) = \sqrt[3]{-27} + x$

g) $\frac{\frac{1}{2}x - 5}{7} - \frac{x - 1}{2} = \frac{2 - 3x}{7}$

d) $\frac{x + 4}{3} - \frac{x - 4}{5} = 2 + \frac{3x - 1}{15}$

h) $\frac{x - 1}{2} - \frac{x + 1}{3} = 4$

☞ Resolvamos las siguientes ecuaciones fraccionarias

a) $\frac{5}{x - 4} = \frac{6}{x - 3}$

Llamamos ecuación fraccionaria a aquella que expresa una igualdad de expresiones algebraicas racionales en cuyo denominador se encuentra la incógnita.

Conviene escribir la ecuación de forma que no tenga fracciones.

Multiplicando ambos miembros por el M.C.D., $(x - 4)(x - 3)$ tenemos

$$(x - 4)(x - 3) \frac{5}{x - 4} = \frac{6}{x - 3} (x - 4)(x - 3)$$

aplicando propiedades se obtiene una ecuación lineal

$$5(x - 3) = 6(x - 4)$$

$$5x - 15 = 6x - 24$$

$$9 = x$$

Al multiplicar a ambos miembros de una ecuación por expresiones que impliquen la variable x no se está garantizando que la última ecuación sea equivalente a la original. Se debe verificar si el valor obtenido de la variable satisface o no la ecuación original.

Sustituyendo por 9 la ecuación original, se obtiene

$$\frac{5}{9-4} = \frac{6}{9-3}$$

$$1 = 1 \quad \text{que es un enunciado verdadero.}$$

Por lo tanto, 9 es solución de la ecuación dada.

$$S = \{9\}$$

$$b) \quad \frac{3x+4}{x+2} - \frac{3x-5}{x-4} = \frac{12}{(x-4)(x+2)}$$

Multiplicando ambos miembros por el M.C.D., $(x-4)(x+2)$ tenemos

$$(x-4)(x+2) \left(\frac{3x+4}{x+2} - \frac{3x-5}{x-4} \right) = \frac{12}{(x-4)(x+2)} (x-4)(x+2)$$

aplicando propiedades se obtiene una ecuación lineal

$$(x-4)(3x+4) - (x+2)(3x-5) = 12$$

$$3x^2 - 8x - 16 - (3x^2 + x - 10) = 12$$

$$3x^2 - 8x - 16 - 3x^2 - x + 10 = 12$$

$$3x^2 - 8x - 16 - 3x^2 - x + 10 = 12$$

$$-9x - 6 = 12$$

$$-9x = 18$$

$$x = -2$$

Sin embargo la ecuación original no está definida para $x = -2$, de modo que no existen raíces. El conjunto solución es $S = \emptyset$. Aunque -2 es una solución de ésta ecuación, no lo es de la ecuación original y se la denomina solución extraña de la ecuación original.

2) Resuelve las ecuaciones fraccionarias indicadas en cada apartado

$$a) \quad \frac{\frac{x}{3} + \frac{1}{5}}{\frac{x}{3} - \frac{1}{5}} = -1$$

$$b) \quad \frac{5}{5-x} + \frac{4}{7x-35} = \frac{31}{7}$$



$$c) \frac{1}{2} \left(1 - \frac{x-1}{x+1} \right) = \frac{1}{x+1}$$

$$d) \frac{x-5}{5-x} = -1$$

$$e) x+1 - \frac{2(x+1)^2}{x-1} = -\frac{7+x^2}{x-1}$$

$$f) \frac{a}{x-1} = \frac{2a}{x^2-1} - \frac{a}{x+1}$$

3) Aplicando la condición de anulación del producto ($\mathbf{a \cdot b = 0 \Leftrightarrow a=0 \vee b=0}$) encuentra, en cada ecuación, el conjunto de soluciones

$$a) x^2(2x-1)(-x-\sqrt{2})=0$$

$$d) (x^3-8)(x+2)=0$$

$$b) (x^2+\sqrt{2})x=0$$

$$e) \frac{1}{x}(x^2+1)=0$$

$$c) \left(\frac{1}{x} - 1 \right) \cdot x^3 = 0$$

☞ Resolvamos las siguientes ecuaciones

$$a) |x-5|=10$$

por definición de valor absoluto resulta que:

$$x-5=10 \quad \text{o} \quad x-5=-10$$

$$x=15 \quad \text{o} \quad x=-5$$

$$b) \log_5(2x+3)=3$$

por definición de logaritmo resulta que

$$5^3 = 2x+3$$

$$125 = 2x+3$$

$$122 = 2x$$

$$61 = x$$

Recordemos:

$$\log_a x = b \Leftrightarrow a^b = x \text{ con } x>0 \wedge a \neq 1, a>0$$

Verificando en la ecuación original

$$2. 61+3 > 0$$

Por lo tanto, $x = 61$ es solución de la ecuación

4) Calcula el o los valores de x en cada una de las siguientes ecuaciones

a) $|3x - 2| = 5$

f) $3\log_2(x + 1) - \log_2(x + 1) = 2$

b) $|1 - 4x| = 4$

g) $\log_2(4x - 3) = 8$

c) $\frac{1}{3} \cdot \left| \frac{5}{3} - \frac{1}{2}x \right| + 1 = \frac{5}{3}$

h) $\log_3(x + 2) = 0$

d) $\left| -2x + \frac{3}{4} \right| + 2 = \frac{5}{2}$

i) $2^x 8 = \frac{1}{16}$

e) $2^{x+1} = \sqrt{2}$

j) $\frac{3^{2x+1}}{3^{x-4}} = 81$

Problemas

5) De un depósito lleno de líquido se saca la mitad del contenido, después la tercera parte del resto y quedan aún 1600 litros. Calcula la capacidad del depósito.

6) La semisuma de un número y su consecutivo, aumentada en la tercera parte de dicho número da como resultado la sexta parte de treinta y cinco. ¿Cuál es el número?

7) El cociente entre dos números pares sucesivos es igual a 1,01. Determina éstos.

8) En una fábrica se produce un producto compuesto de dos elementos que llamaremos A y B. El elemento A se produce a razón de 4,5 unidades por hora y el elemento B a razón de 8 unidades por hora. Al comenzar la fabricación hay una existencia de 90 unidades del producto A u 20 de producto B. En un instante dado, se inicia simultáneamente la producción de los elementos. Determina después de cuánto tiempo las cantidades de los elementos A y B son iguales y qué cantidad de unidades del producto final se podrán armar.

9) En un año, un fabricante de carteras descubrió que el 2% de las mismas fueron retiradas de la venta por imperfecciones. Si se fabrican C carteras en un año, ¿cuántas tendrá el fabricante que retirar de la venta?.



Este año se proyecta una venta anual de 2000 carteras. Aproximadamente, ¿cuántas carteras deberá fabricar si toma en cuenta las rechazadas.

I-1-2- Algo más sobre Ecuaciones

Hasta el momento te has enfrentado con situaciones en las que debías encontrar el valor de una incógnita de modo tal que verifiquen una igualdad.

Pero, no siempre, las ecuaciones se presentan del mismo tipo de las que has trabajado.

Por ejemplo; te proponemos resolver las siguientes ecuaciones:

$$a) \frac{5}{2}x - 1 = \frac{1}{4}(10x - 2) - \frac{1}{2}$$

$$b) 3x - 2 = \frac{1}{2}(6x - 2) + \left(-\frac{1}{2}\right)$$

En la primera; a través de las distintas transformaciones que realizas, utilizando propiedades; llegarás seguramente a una expresión: $0 \cdot x = 0$

Esto significa que x puede asumir cualquier número real, es decir $\forall x \in R$, verificando la igualdad.

En cambio en la segunda ecuación; te encontrarás con una situación de la forma: $0 \cdot x = \frac{1}{2}$

En este caso la incógnita no puede asumir ningún número real, es decir $\nexists x \in R$, que verifique la igualdad.

En toda expresión del tipo $a \cdot x = b$, donde se deba encontrar el valor de x que verifique la igualdad, puede suceder:

- Si $a \neq 0$ en cuyo caso $x = \frac{b}{a}$, decimos que la ecuación es **compatible** con **solución única** y se indica

$S = \left\{ \frac{b}{a} \right\}$, donde S es el conjunto solución

- Si $a = 0$, o sea $0 \cdot x = b$, según el valor de b puede ser:

○ $b = 0$, la ecuación es $0x = 0$, x puede tomar cualquier valor y la ecuación recibe el nombre de **compatible con infinitas soluciones (indeterminada)** y el conjunto solución se indica $S = R$

○ $b \neq 0$, la ecuación es $0x = b$, **no existe ningún valor de x** que verifique la igualdad y la ecuación recibe el nombre de ecuación **incompatible** y el conjunto solución se indica $S = \emptyset$

Problemas

10) Resuelve las siguientes ecuaciones, indica el conjunto solución

a) $\frac{3}{2}x + (-2) = \frac{1}{4}(6x - 2) + \left(-\frac{1}{2}\right)$

f) $\frac{x-2}{3} - \frac{1-2x}{2} = \frac{4x-1}{3}$

b) $(-3)\left(\frac{x-3}{27}\right) + 0,1x = \frac{1}{3}$

g) $\frac{\frac{2}{3}(5x-2) - \frac{2}{3}}{2 - \frac{1}{5}(x-1)} = -2$

c) $2(x+2) = 3x + \left(-\frac{2}{3}\right)(x+1) + \left(-\frac{1}{3}x\right)$

h) $\left|x - \frac{1}{3}\right| = (-9)$

d) $2x + \frac{3}{2} = \frac{1}{2}(4x+3) + (-4x)$

i) $\left|\left(-\frac{2}{5}\right) + x\right| = 0$

e) $\left(-\frac{1}{2}\right)(0,4x+3) = -\left(1,5 + \frac{1}{5}x\right)$

j) $\frac{4}{x-5} = 0$

I -2- 6 Otras estrategias para resolver ecuaciones

Ya hemos visto algunos procedimientos para resolver ecuaciones de una incógnita de grado superior a uno. Conviene en este momento observar que si consideramos ecuaciones del tipo (ecuación cuadrática o de segundo grado)

$$ax^2 + bx + c = 0$$

puede deducirse la expresión:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

que nos permite hallar las dos soluciones de la misma o sea:



$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad y \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

en este caso particular podrá por simple sustitución comprobarse la validez de las mismas.

Como ejemplo proponemos: $2x^2 - 10x + 12 = 0$

$$x_1 = \frac{10 + \sqrt{(-10)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 12}}{2 \cdot 2} = \frac{10 + 2}{4} = 3 \quad y \quad x_2 = \frac{10 - \sqrt{(-10)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 12}}{2 \cdot 2} = \frac{10 - 2}{4} = 2$$

Observamos que ambos valores verifican la ecuación ;en efecto:

$$* \quad 2 \cdot 3^2 - 10 \cdot 3 + 12 = 0$$

$$* \quad 2 \cdot 2^2 - 10 \cdot 2 + 12 = 0$$

Por lo que ya sabemos el cálculo de $\sqrt{b^2 - 4ac}$ dependerá del radicando, que convenimos en llamar **discriminante** y escribimos

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

el simple concepto de raíz cuadrada nos permite observar que si:

- ✓ $\Delta > 0$ existirá $\sqrt{\Delta}$ y en consecuencia existen dos soluciones distintas para la ecuación.
- ✓ $\Delta = 0$, es $\sqrt{0} = 0$ y en consecuencia las expresiones que dan x_1 y x_2 resultan iguales
- ✓ $\Delta < 0$, no existe, en $\mathbb{R}$, $\sqrt{\Delta}$ y en consecuencia no habrá soluciones reales de la ecuación.

Aún podemos conocer algunas particulares propiedades de las que gozan las soluciones de las ecuaciones de segundo grado.

Así:

Si sumamos las dos soluciones x_1 y x_2 observamos que: $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$

Si multiplicamos las dos soluciones x_1 y x_2 observamos que: $x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$

Estas propiedades resultan altamente significativas en el proceso inverso, es decir si conocemos las soluciones de una ecuación de segundo grado podemos encontrar la ecuación de las que proceden.

Problemas

11) Encuentra el conjunto solución de las siguientes ecuaciones:

a) $\{x / 4x^2 - 17x = -15 \wedge x \in R\}$

b) $\{y / 2 + 6\sqrt{2}y + 9y^2 = 0 \wedge y \in R\}$

c) $\{p / p^2 + p + 1 = 0 \wedge p \in R\}$

12) Construye ecuaciones cuadráticas con coeficientes enteros y que posean por raíces los números

a) 2; -3

b) $\sqrt{5}$; $-\sqrt{5}$

c) $\frac{3 + \sqrt{2}}{2}$; $\frac{3 - \sqrt{2}}{2}$

13) Determina el número real k de modo que la ecuación:

a) $4x^2 + kx + 6 = 0$ tenga una raíz igual a 2

b) $5x^2 + 8x + k = 0$ tenga raíces cuyo producto sea $\frac{1}{3}$

c) $4x^2 + 20x + k = 0$ tenga raíces iguales

d) $2x^2 + (4 - k)x - 17 = 0$ cuyas raíces sean números opuestos

e) $2x^2 - kx + 8 = 0$ no tenga solución en R

14) Encuentra las dimensiones de un rectángulo si su diagonal mide 17 cm y su perímetro 46 cm.

15) El producto de dos números es 736, si la diferencia entre ambos es 9. ¿Cuáles son estos números?

16) La suma de un número y su recíproco es $\frac{34}{15}$. Determina el número.



17) Un terreno rectangular de 4m x 8m es usado como jardín. Se decide poner una vereda en toda la orilla interior de modo que 12 m² del terreno se dejan para flores. ¿Cuál debe ser el ancho de la vereda?

18) Si las longitudes, en cm, de los lados de un triángulo rectángulo son: $(6 - x)$, $(13 - x)$ y $(14 - x)$, determina su perímetro (no darlo en función de x)

19) Resuelve las siguientes ecuaciones.

a) $\frac{1}{x} + \frac{6}{x+4} = 1$

d) $2\sqrt{x+4} - x = 1$

b) $\frac{x}{x+2} - \frac{4}{x+1} = \frac{-2}{x+2}$

e) $x^4 - 5x^2 + 6 = 0$

c) $\frac{x}{x-1} + x = 1 + \frac{1}{x-1}$

f) $x^{-4} - 9x^{-2} + 14 = 0$ (sugerencia: sustituye $x^{-2} = t$)

20) Con tu ingenio, creatividad y aplicando propiedades resuelve las siguientes ecuaciones

a) $4^{2x-1} = \frac{1}{16}$

e) $64 \cdot 4^{1-x^2} = 1$

b) $(3^x - 27)(2^x - 4) = 0$

f) $\frac{9}{3^{2x}} = 3^{-x}$

c) $\sqrt{3^x + 3^x + 3^x} = 9$

g) $3^x = \left(\frac{1}{9}\right)^x$

d) $\frac{1}{3^{|2x+1|}} = 9^{-2}$

21) Calcula el o los valores de y que verifiquen cada una de las siguientes ecuaciones

a) $\sqrt{y^2 + 9} = 5$

c) $\sqrt{y^2 + 33} - y = 3$

b) $\sqrt{(2-y)^2} = 4$ (recuerde: $\sqrt{x^2} = |x|$)

d) $\log_3(2x^2 + 15x) = 2$

II – 2 - 1 La desigualdad en R.

La suma y la multiplicación cumplen ciertas propiedades al relacionarse con las desigualdades (su validez puede ser probada). Tales propiedades son:

- $a \leq b \Rightarrow a + c \leq b + c$, que traducida coloquialmente significa que:

Si a ambos miembros de una desigualdad les sumamos un mismo número se mantiene dicha desigualdad

- $a \leq b, c > 0 \Rightarrow a \cdot c \leq b \cdot c$, o sea

Si a ambos miembros de una desigualdad los multiplicamos por un mismo número positivo se mantiene la desigualdad

- $a \leq b, c < 0 \Rightarrow a \cdot c \geq b \cdot c$, o sea

Si a ambos miembros de una desigualdad los multiplicamos por un mismo número negativo cambia la desigualdad

Tales propiedades adquieren relevante importancia en el estudio y resolución de inecuaciones

II – 2 – 2 - Inecuaciones

Una **inecuación** en una incógnita es una desigualdad condicionada al valor o valores que asuma dicha incógnita.

Resolver una inecuación es encontrar el conjunto de todos los números reales que hace que la desigualdad sea verdadera.

☞ Resolvamos las siguientes inecuaciones, indicando el conjunto solución y representándolo en el eje real.



a)
$$\frac{5}{2}x + \frac{2}{3} > -\frac{1}{6}$$

aplicando propiedad de la suma en R

$$\frac{5}{2}x + \left(-\frac{2}{3}\right) + \frac{2}{3} > -\frac{1}{6} + \left(-\frac{2}{3}\right)$$

por definición de suma en R

$$\frac{5}{2}x > -\frac{5}{6}$$


multiplicando ambos miembros por $\frac{2}{5}$

$$\frac{2}{5} \cdot \frac{5}{2}x > -\frac{5}{6} \cdot \frac{2}{5}$$

por propiedad de la multiplicación en R y definición de multiplicación

$$x > -\frac{1}{3}$$

El conjunto solución es $S = \{x / x > -\frac{1}{3}\}$, siendo su representación en el eje real:



b)
$$-\frac{2}{3} + \frac{5}{9}x \leq x$$

por propiedad de la suma en R, sumamos $\frac{2}{3}$ a ambos

miembros

$$-\frac{2}{3} + \frac{2}{3} + \frac{5}{9}x \leq x + \frac{2}{3}$$

por propiedad de la suma y definición de suma en R

$$\frac{5}{9}x \leq x + \frac{2}{3}$$

sumamos $(-x)$ a ambos miembros

$$\frac{5}{9}x + (-x) \leq x + (-x) + \frac{2}{3}$$

por propiedad de la suma y definición de suma en R

$$-\frac{4}{9}x \leq \frac{2}{3}$$

multiplicando ambos miembros por $-\frac{9}{4}$


$$\left(-\frac{9}{4}\right)\left(-\frac{4}{9}\right)x \leq \frac{2}{3}\left(-\frac{9}{4}\right)$$

propiedad de la multiplicación y definición de multiplicación en

R

$$x \geq -\frac{3}{2}$$

Luego, el conjunto solución es $S = \{x / x \geq (-\frac{5}{2})\}$, siendo su representación en el eje real:



Problemas


22) Completa con el enunciado simbólico o el nombre de la propiedad que se aplica en cada paso de la resolución de las siguientes inecuaciones

a)

Realizando este procedimiento pasamos de una inecuación a otra más fácil de resolver. La inecuación obtenida tiene las mismas soluciones que la original. Es **equivalente** a ella

$$\begin{aligned} \frac{3}{5} \cdot x &< (-2) && \downarrow && \dots\dots\dots \\ \frac{5}{3} \cdot \frac{3}{5} \cdot x &< \frac{5}{3} \cdot (-2) && \downarrow && \dots\dots\dots \\ \left(\frac{5}{3} \cdot \frac{3}{5}\right) \cdot x &< \frac{5}{3} \cdot (-2) && \downarrow && \dots\dots\dots \\ 1 \cdot x &< \left(-\frac{10}{3}\right) && \downarrow && \dots\dots\dots \\ x &< \left(-\frac{10}{3}\right) \end{aligned}$$

Representamos el conjunto de las soluciones de la inecuación dada






b)

¡Cuidado!
Al multiplicar por un
mismo número
negativo a ambos
miembros de la
inecuación cambia el
sentido de la
desigualdad

$$\begin{aligned}
 &(-0, \bar{3}) \cdot x < 2 \\
 &\downarrow \dots\dots\dots \\
 &(-3) \cdot (-0, \bar{3}) \cdot x > (-3) \cdot 2 \\
 &\downarrow \dots\dots\dots \\
 &[(-3) \cdot (-0, \bar{3})] \cdot x > (-6) \\
 &\downarrow \dots\dots\dots \\
 &1 \cdot x > (-6) \\
 &\downarrow \dots\dots\dots \\
 &x > (-6)
 \end{aligned}$$

Representamos el conjunto de las soluciones de la inequación dada



23) Representa en el eje real los siguientes conjuntos

a) $\left\{ x / 4x - \frac{5}{2} \geq 0 \right\}$

c) $\left\{ z / -\frac{1}{2} \leq -z < 3 \right\}$

b) $\left\{ y / \frac{4}{3} < y - \frac{1}{6} \right\}$

e) $\left\{ y / 6 + 2 \cdot (1 - y) \leq \frac{1}{2} y - \frac{1}{4} \right\}$

c) $\left\{ x / \frac{1-2x}{4} < 2x \right\}$

24) ¿Para qué valores de x está definida cada una de las siguientes expresiones en R?

a) $\sqrt{\frac{1}{2}x - 3}$

b) $\sqrt{\frac{-2}{2-4x}}$

c) $\log(2x+3)$

d) $\log \frac{-1}{(x-2)}$

25) Resuelve las siguientes inequaciones, indica el conjunto solución utilizando la notación de intervalos, y represéntalo en el eje real.

a) $x - 4 \geq 6$

f) $\frac{1}{2}x + 3 > -\frac{1}{2}x + 4$

b) $x^2 + 3 \geq 0$

g) $\frac{5x + 2}{5} < \frac{2(x - 3)}{-4}$

c) $(x-4) \cdot (x+1) - 3 \geq (x-2)^2 + 7$

h) $\frac{-2}{x-1} > 0$

d) $6x + 2 < 3x$

i) $\frac{1-x}{2} + \frac{x}{3} \geq (-2)^{-1}$

e) $0x > 0$

26) Sergio trabaja en el departamento de ventas de una empresa, cobrando el 5% de sus ventas, sin ningún básico fijo. Ayer, el jefe de personal le informó que para el mes que viene le darían un básico mensual de \$3500, pero le rebajarían las comisiones al 3%. ¿Será mejor esta propuesta? ¿Para qué montos de ventas conviene este sistema?

27) En un microemprendimiento se piensa fabricar chinelas para adultos. Por cada par de chinelas se calcula un gasto en materiales de \$12 y además por mes un gasto fijo en impuestos, alquiler y servicios que alcanza los \$3000. Si se piensa vender cada par en \$36, ¿Cuántos pares hay que vender mensualmente, como mínimo para obtener algún beneficio? ¿Con cuántos pares mensuales vendidos, se obtendrá una ganancia de \$4000?

28) Juan ha gestionado una beca para continuar sus estudios especializados en Matemática. Para poder obtenerla entre los requisitos que le solicitan es aprobar tres exámenes con un promedio de 8 o más puntos. Si ya ha rendido dos de esas pruebas con calificaciones 9 y 8 ¿qué calificaciones puede tener en su tercer examen?

II – 2 - 3- Sistemas de ecuaciones

Toda expresión de la forma:

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b ,$$

donde $x_1; x_2; \dots; x_n$ son **incógnitas** y $a_1; a_2; \dots; a_n; b$ son números reales, al menos uno distinto de cero, denominados **coeficientes**, se llama ecuación lineal en las incógnitas $x_1; x_2; \dots; x_n$.

- Dos sistemas de ecuaciones lineales de m ecuaciones con n incógnitas son equivalentes sí y sólo si tienen la misma solución general.
- Si sobre un sistema de ecuaciones se efectúa cualquiera de los siguientes transformaciones u operaciones elementales:
 - a) intercambiar dos ecuaciones
 - b) multiplicar una ecuación por un número distinto de cero
 - c) reemplazar una ecuación por la suma de ésta con otra multiplicada por un número distinto de cero se obtiene un sistema equivalente al dado (Teorema de equivalencia de sistemas)

Si tenemos en cuenta la definición de combinación lineal de ecuaciones de un sistema podemos expresar las operaciones b) y c) como una sola: "Sustituir una ecuación por una combinación lineal de ella misma con otras del sistema"

Ejemplos de sistemas equivalentes:

$$1) \begin{cases} 2x + y = 1 \\ -x - y = 0 \end{cases} \text{ es equivalente con } \begin{cases} -x - y = 0 \\ 2x + y = 1 \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} 2x + y = 1 \\ -x - y = 0 \end{cases} \text{ es equivalente con } \begin{cases} 2x + y = 1 \\ x + y = 0 \end{cases}$$

$$3) \begin{cases} 2x + y = 1 \\ -x - y = 0 \end{cases} \text{ es equivalente con } \begin{cases} 2x + y = 1 \\ x = 1 \end{cases}$$

¡Verifique!

☞ Veamos entonces cómo proceder para resolver sistemas, circunscribimos la situación a sistemas 2×2 y 3×3

Así, sea el sistema:
$$\begin{cases} 2x + 3y = 5 \\ 3x + 2y = 5 \end{cases}$$

Trataremos de construir un sistema equivalente de modo que una de las ecuaciones posea una incógnita menos (**eliminación de incógnitas**)

sustituiremos la segunda ecuación por el resultado de sumarle a la misma multiplicada por 2, la primera multiplicada por (-3)



$$\begin{cases} 2x + 3y = 5 \\ 3x + 2y = 5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x + 3y = 5 \\ (6x + 4y) + (-6x - 9y) = 5 \cdot 2 + 5(-3) \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x + 3y = 5 \\ -5y = -5 \end{cases} \text{ hemos obtenido un **sistema escalonado**.}$$

Un sistema es escalonado cuando a partir de la segunda ecuación cada una empieza por lo menos con un coeficiente nulo más que la anterior

A partir del mismo resulta

$$\begin{cases} 2x + 3y = 5 \\ -5y = -5 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} 2x + 3y = 5 \\ y = 1 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} 2x + 3 \cdot 1 = 5 \\ y = 1 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \end{cases}$$

Esta estrategia recordamos, se denomina de eliminación de incógnitas

No es ésta la única estrategia. Podemos ver otras, que se conocen vulgarmente como **método de igualación** y **método de sustitución**, y que no son más que la aplicación del Teorema de equivalencias de un modo particular, se presentan de esta forma:

Método de igualación:

$$\begin{cases} 2x - y = 3 \\ 4x + 5y = -8 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} y = 2x - 3 \\ y = \frac{-8 - 4x}{5} \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} y = 2x - 3 \\ 2x - 3 = \frac{-8 - 4x}{5} \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = 2x - 3 \\ x = \frac{7}{14} \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} y = 2 \cdot \frac{1}{2} - 3 \\ x = \frac{1}{2} \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} y = -2 \\ x = \frac{1}{2} \end{cases}$$

Método de sustitución

$$\begin{aligned}
 \begin{cases} 2x - y = 0 \\ -3x + 2y = -7 \end{cases} &\longrightarrow \begin{cases} y = 2x \\ -3x + 2y = -7 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} y = 2x \\ -3x + 2(2x) = -7 \end{cases} \longrightarrow \\
 \begin{cases} y = 2x \\ x = -7 \end{cases} &\longrightarrow \begin{cases} y = 2(-7) \\ x = -7 \end{cases} \longrightarrow \boxed{\begin{cases} y = -14 \\ x = -7 \end{cases}}
 \end{aligned}$$

Problemas:

29) Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones

$$\begin{aligned}
 \text{a) } \begin{cases} 5x - 3y = 7 \\ 2x + 7y = 11 \end{cases} & \quad \text{f) } \begin{cases} \frac{x+y}{2} + \frac{x-y}{3} = 15 \\ x - \frac{2y}{5} = 12 \end{cases} \\
 \text{b) } \begin{cases} 4x - 3y = 24 \\ \frac{x}{5} = \frac{y}{4} \end{cases} & \quad \text{g) } \begin{cases} \frac{y}{4} - \frac{x}{7} = \frac{29}{28} \\ \frac{x}{4} - \frac{y}{7} = \frac{1}{4} \end{cases} \\
 \text{c) } \begin{cases} 3x + \frac{y}{5} = 15 \\ 4y - \frac{31x}{4} = 29 \end{cases} & \quad \text{h) } \begin{cases} \frac{1}{4}x - y = 7 \\ 3x - 4y = 8 \end{cases} \\
 \text{d) } \begin{cases} -x + 2y = 2 \\ 2x - 3y = -10 \end{cases} & \quad \text{i) } \begin{cases} y - x = 4 \\ -\frac{1}{2}x + 1 = y \end{cases}
 \end{aligned}$$

30) En un campo hay gallinas y vacas. El total de animales es 60 y se cuentan 150 patas. ¿Cuántos animales hay de cada tipo en el corral?

31) Si al doble de un n° se le suma el triple de otro, se obtiene 31. Pero si al triple del primero, se le resta el doble del segundo, se obtiene 1. ¿Cuáles son los n°?

32) En abril Hilda compró 15 diarios y dos revistas y gastó \$29.50. Ese mismo mes Liliana compró 20 diarios y 3 revistas y gastó \$40.50. ¿Cuánto costó cada diario y cada revista?

33) Con las treinta y cuatro billetes de 5 y 10 pesos que tenía ahorrado compré una camisa de \$280. ¿Cuántas monedas de cada valor tenía?




- 34) Un hotel tiene habitaciones dobles y simples. Tiene en total 50 habitaciones y 87 camas. ¿Cuántas habitaciones tiene de cada tipo?
- 35) La suma de las superficies de dos campos rectangulares es de 7,5 hectáreas. El más grande produce 70 toneladas de remolacha por hectárea y el otro 60 toneladas por hectárea. La cosecha de los dos campos se vendió a \$6.187.500. a razón de \$ 12.500 la tonelada. Calcula la superficie de cada campo. Los dos campos tienen un ancho común que es de 150 m. ¿Cuál es el largo de cada uno?
- 36) Don José posee un negocio de venta de café en grano y quiere preparar un café especial para sus clientes. Para ello va a mezclar dos tipos de café. Un café común que cuesta \$60 el kg y un café selección de \$90 el kg. Va a preparar bolsas de 1 kg que venderá a \$80. ¿Cuántos gramos de cada café deberá poner en cada bolsa?
- 37) Un comerciante compró manzanas de \$1,80 cada una y naranjas de \$0,80 cada una por un total de \$144. Las vendió con una ganancia del 20% en las manzanas y del 50% en las naranjas. En total recibió \$190,08. ¿Cuántas manzanas y cuántas naranjas había comprado?

Cáp. 3: TRIGONOMETRIA ÁNGULO PLANO CONVEXO

Definición:

Llamamos **ángulo plano convexo abc** y se simboliza $\hat{abc}$ al conjunto de puntos del plano barridos por la semirrecta $\overrightarrow{ba}$ al pasar de su posición inicial P a una posición final P' , describiendo el punto "a" un arco de circunferencia menor o igual que una semicircunferencia o igual a una circunferencia

Gráficamente :



Simbólicamente:

$\hat{abc}$


Clasificación de los ángulos convexos

Según el arco de circunferencia que describe, podemos clasificar los ángulos en :

Ángulo Recto

Es todo ángulo cuyo arco correspondiente es la cuarta parte de una circunferencia.

Gráficamente:



Simbólicamente:


$\hat{R}$



Ángulo llano

Es todo ángulo cuyo arco correspondiente es la mitad de una circunferencia.

Gráficamente:




Simbólicamente:

$\hat{L}$

Ángulo de una vuelta

Es todo ángulo cuyo arco correspondiente es una circunferencia.

Gráficamente:




Simbólicamente:

$\hat{V}$

Ángulo nulo

Es todo ángulo cuyo arco correspondiente es un arco nulo.

Gráficamente:




Simbólicamente:

$\hat{N}$

Sabías que...

Llamamos **ángulo plano cóncavo** abc y se simboliza $\hat{abc}_{\text{cóncavo}}$ al conjunto de puntos del plano barridos por la semirrecta $\overrightarrow{ba}$ al pasar de una posición inicial P a una posición final P' , describiendo un arco mayor que una semicircunferencia y menor que una circunferencia.



EL ÁNGULO Y SU MEDIDA

Del mismo modo que para medir segmentos, cada vez que medimos un ángulo utilizamos una unidad de medida conveniente. Esta unidad es elegida dentro de las unidades convencionales dando lugar a diversos sistemas de medición de ángulos.

Nos ocuparemos de dos de ellos:

- Sistema sexagesimal
- Sistema Circular o del Radián

a) Sistema sexagesimal

El sistema sexagesimal de medición de ángulos data de la antigua Babilonia donde los habitantes consideraron que el año tenía 360 días y tomaron como unidad de medida angular el recorrido diario del Sol alrededor de la Tierra y, por lo tanto, adoptaron como unidad de medida un submúltiplo del ángulo de una vuelta, más exactamente como:

$$\frac{1}{360} \text{ de } \hat{V}$$

Así obtenemos el ángulo llamado de un grado sexagesimal cuya simbología es: 1°
De esta definición resultará para los ángulos clasificados anteriormente:

$$\hat{V} = 360 \cdot 1^\circ = 360^\circ$$

$$\hat{L} = 180 \cdot 1^\circ = 180^\circ$$

$$\hat{R} = 90 \cdot 1^\circ = 90^\circ$$

$$\hat{N} = 0 \cdot 1^\circ = 0^\circ$$

Algunos submúltiplos del grado reciben nombres particulares, ellos son:

$$1 \text{ minuto} = 1' = \frac{1}{60} \cdot 1^\circ$$

$$1 \text{ segundo} = 1'' = \frac{1}{60} \cdot 1' = \frac{1}{3600} \cdot 1^\circ$$

Problemas de Aplicación

1) Calcula el valor de $\hat{\alpha}$, expresado en grados, minutos y segundos:

a) $\hat{\alpha} = 2^\circ,8 + 17^\circ 35'$

b) $\frac{5\hat{\alpha} + 8^\circ 3'}{2} = 25^\circ,4$

Recuerda:

Ángulos complementarios: dos ángulos son complementarios cuando la suma de sus medidas es la medida de un ángulo recto.

Ángulos suplementarios: dos ángulos son suplementarios cuando la suma de sus medidas es la medida de un ángulo llano.

2) Determina el valor del ángulo cuyo doble es igual a su complementario disminuido en 20° .

3) La suma entre el triple de la medida de un ángulo y la medida del suplemento del mismo es 210° . Hallar la medida del mismo



- 4) El suplemento de un ángulo $\hat{\beta}$ es de $162^\circ 20''$. ¿Cuál es la medida de la suma entre la medida del ángulo $\hat{\beta}$ y la de su complementario?
- 5) Si el ángulo $\hat{\alpha}$ mide $24^\circ 10'$, calcula el triple de $\hat{\beta}$ siendo $\hat{\beta} = \frac{1}{2}\hat{\alpha} + 30^\circ 10'$.
- 6) Si $\hat{\alpha} = 179^\circ 59' 59''$ y $\hat{\beta} = 30^\circ 10' 20''$; calcula:
- El complemento de $\hat{\beta}$ más el suplemento de $\hat{\alpha}$.
 - La mitad de $\hat{\alpha}$ menos la quinta parte de $\hat{\beta}$.


b) Sistema Circular o del Radián

En este sistema de medición de ángulos, la unidad de medida la denominaremos **RADIÁN** y la simbolizaremos:

$$1 \text{ rad} = 1 \text{ radián}$$

Definiremos al Radián de la siguiente manera:

Dada una circunferencia de centro o y radio R , el ángulo central $\hat{\alpha}$ es de un Radián, cuando la medida del arco correspondiente a dicho ángulo es igual a la medida del radio de la circunferencia.



De lo expuesto para el ángulo de una vuelta ($\hat{v}$) resulta:


$$\hat{v} = 360^\circ = 2\pi \text{ radianes}$$

Problemas

- 1) Expresar en radianes los siguientes ángulos dados en el sistema sexagesimal
 - a) 360°
 - b) 130°
 - c) 90°
 - d) 45°
 - e) 30°
 - f) 270°
 - g) 60°
- 2) Expresa en el sistema sexagesimal
 - a) $3\frac{\pi}{2}$
 - b) $3\frac{\pi}{6}$
 - c) $5\frac{\pi}{4}$
 - d) $\frac{\pi}{5}$
 - e) $2\frac{\pi}{5}$
- 3) Transforma del sistema sexagesimal al circular o viceversa según corresponda
 - a) $36^\circ 20' 12''$
 - b) $323^\circ 18' 17'',2$
 - c) 1,389
 - d) 0,0023

ALGO MÁS SOBRE EL SISTEMA CIRCULAR. LONGITUD DE ARCO DE CIRCUNFERENCIA

Consideremos un conjunto de circunferencias concéntricas $C_1; C_2; \dots; C_n$ cuyos radios miden respectivamente $r_1; r_2; \dots; r_n$.



Sea $\hat{\alpha}$ un ángulo con vértices en el centro O de las circunferencias, correspondientes a los arcos:

$$\widehat{AB} \text{ o } \widehat{PQ} \text{ o } \widehat{MN}$$

Sabemos que las medidas de estos arcos son proporcionales a los respectivos radios, por lo tanto si

$$m(\widehat{AB}) = a_1 \quad m(\widehat{PQ}) = a_2 \quad \dots \quad m(\widehat{MN}) = a_3$$

tenemos que:

$$\frac{a_1}{r_1} = \frac{a_2}{r_2} = \dots = \frac{a_n}{r_n}$$

Pero si tenemos $r_1 = 1$ resulta que

$$\frac{a_1}{r_1} = \text{medida de } \hat{\alpha} \text{ en radianes}$$

Resulta así que:

$$\frac{a_1}{r_1} = \frac{a_2}{r_2} = \dots \frac{a_n}{r_n} = \text{medida de } \hat{\alpha} \text{ en radianes}$$

Es decir que si $\hat{\alpha}$ es un ángulo correspondiente a un arco $\widehat{PQ}$ de una circunferencia de radio OP se tiene que:

$$\alpha(\text{rad}) = m(\hat{\alpha}) \text{ en radianes} = \frac{m(\widehat{PQ})}{m(OQ)} = \frac{a}{r}$$

$$\boxed{\alpha(\text{rad}) = \frac{a}{r}}$$

de esta relación se obtiene:

$$a = r \cdot \alpha(\text{rad})$$

Es decir que la medida de un arco de circunferencia de radio r correspondiente a un ángulo $\hat{\alpha}$ es igual al producto del ángulo $\hat{\alpha}$, medido en radianes, por la medida del radio.

Problemas

- 4) Calcula en cm la longitud de un arco de circunferencia de 5m de radio, correspondiente a un ángulo central de $45^\circ 30'$
- 5) Calcula el arco correspondiente a un lado de un hexágono regular inscripto en una circunferencia de 30 cm de radio.
- 6) Calcula en m la longitud del radio de una circunferencia tal que al ángulo central de 30° corresponde un arco de 39,27cm




Razones trigonométricas de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo

La Trigonometría es la rama de la matemática que analiza las relaciones entre la medida de los ángulos y lados de un triángulo.

En particular nos ocuparemos de **Resolución de triángulos rectángulos**;

En primer lugar es conveniente darles nombres a algunos elementos que componen el triángulo rectángulo.




Llamamos:

- Cateto adyacente con referencia al $\hat{\alpha}$ del $\triangle abc$ al segmento $\overline{ac}$.
- Cateto opuesto con referencia al $\hat{\alpha}$ del $\triangle abc$ al segmento $\overline{bc}$.
- Hipotenusa del triángulo $\triangle abc$ al segmento $\overline{ab}$.

Observación:

La hipotenusa de un triángulo rectángulo es siempre el lado opuesto al ángulo recto.

En base a lo expuesto y considerando el $\triangle abc$, completa:



En el triángulo $\triangle abc$, con referencia al $\hat{\beta}$, se llama:

- Cateto opuesto al segmento
- Cateto adyacente al segmento
- Hipotenusa al segmento

Definición de las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo.


Consideremos un ángulo $\hat{a}$ cualquiera agudo.

Sean $\triangle ab_1c_1$; $\triangle ab_2c_2$; $\triangle ab_3c_3$ algunos de los triángulos rectángulos que podemos

construir según indicamos en la figura, con $\hat{a}$ ángulo común y b_1 ; b_2 ; b_3 ; c_1 ; c_2 ; c_3 puntos pertenecientes a los lados de dicho ángulo:

Según hemos visto, resulta:

$$\triangle ab_1c_1 \sim \triangle ab_2c_2 \sim \triangle ab_3c_3$$



Entonces, las medidas de sus lados son proporcionales, es decir:

$$\frac{b_1c_1}{ab_1} = \frac{b_2c_2}{ab_2} = \frac{b_3c_3}{ab_3} = k_1$$

$$\frac{ac_1}{ab_1} = \frac{ac_2}{ab_2} = \frac{ac_3}{ab_3} = k_2$$

$$\frac{b_1c_1}{ac_1} = \frac{b_2c_2}{ac_2} = \frac{b_3c_3}{ac_3} = k_3$$

Cada una de esta serie de razones iguales, que son independientes de los triángulos

considerados y que sólo varían si varía $\hat{a}$, reciben nombres especiales.

Así:

$$k_1 = \frac{\text{medida del cateto opuesto a } \hat{a}}{\text{medida de la hipotenusa}} = \text{seno de } \hat{a} = \text{sen } \hat{a}$$

$$k_2 = \frac{\text{medida del cateto adyacente a } \hat{a}}{\text{medida de la hipotenusa}} = \text{coseno de } \hat{a} = \text{cos } \hat{a}$$

$$k_3 = \frac{\text{medida del cateto opuesto a } \hat{a}}{\text{medida del cateto adyacente a } \hat{a}} = \text{tangente de } \hat{a} = \text{tg } \hat{a}$$

A tales expresiones: $\text{sen } \hat{a}$; $\text{cos } \hat{a}$; y $\text{tg } \hat{a}$ se las denomina:

RAZONES TRIGONOMETRICAS DE $\hat{a}$.




Resolver un triángulo rectángulo consiste en determinar las medidas de todos sus elementos, entendiéndose por ellos a sus lados y ángulos interiores.


Se debe tener en cuenta que las expresiones a emplear deberán seleccionarse según el caso a resolver.

Problemas


- 11) Halla la superficie de un rectángulo cuya base es de 16 m y la diagonal forma con ella un ángulo de $34^{\circ}30'16''$
- 12) Calcula los ángulos interiores y la superficie de un triángulo isósceles cuya base mide 40 cm y cada lado congruente 60 cm.
- 13) Un edificio está ubicado en la esquina y tiene una ochava de 45° con un frente de 4,20m. En la planta alta se quiere construir un balcón en voladizo siguiendo la línea de las paredes, como indica la figura. ¿Qué longitud tendrá cada pared del balcón?




- 14) En la figura $\hat{A} = 20^{\circ}33'15''$; $\hat{C} \hat{B} D = 50^{\circ}34'27''$; $CB = 12,5m$ Calcula la medida de AB. (AD es perpendicular a CD)



- 15) ¡Penal! La pelota se sitúa en el punto fatídico a 11m del arco, que mide 7,42m entre poste y poste. El jugador lanza la pelota a ras del suelo 18° hacia la derecha de la línea imaginaria que une el punto de penal con el centro del arco. El arquero engañado se tira hacia el otro lado ¿será gol?



- 6) Calcula x e y en la siguiente figura





Autoevaluación nº 1

Determina si cada una de las siguientes apartados son verdaderos o falsos:

1. La ecuación $2(x+2) = 3x + \left(-\frac{2}{3}\right)(x+1) + \left(-\frac{1}{3}x\right)$ posee infinitas soluciones.
2. Las soluciones de la ecuación: $\left|2x - \frac{x-1}{3}\right| = 1$ son $x = 0$ y $x = -2$.
3. $x = 2$ es solución de la ecuación $\log_2(x - \sqrt{2}) = \frac{1}{2}$.
4. La expresión $\sqrt{\frac{1}{x^2+1}}$ es válida para cualquier valor de x .
5. $\sqrt{\frac{\sqrt{a} \cdot a^{-3}}{\frac{1}{a}}} = a^{-\frac{3}{2}}$
6. Si $x^2 - y^2 = 33616$ y $(x - y) = 88$, resulta que $(x + y) = 382$.
7. El valor de $(a \cdot b) = 2,5$, entonces el valor de la expresión: $\frac{a^3 b^5 : (ab)^3}{a^2 b^4}$ es $\frac{4}{25}$.
8. No posee solución la ecuación: $3^{x+1} \cdot \left(\frac{1}{27}\right)^x = \frac{1}{3}$.

Apartado	1	2	3	4	5	6	7	8
Puntaje	15	15	10	10	10	10	15	15

Autoevaluación nº 2

1. Resuelve las siguientes ecuaciones:

a) $\frac{x+2}{x-1} + \frac{x+1}{2-x} = 0$

b) $\log_3(x+1) + 2\log_3(x+1) = 3$

c) $\sqrt{x-3} = \sqrt{x} - 3$

d) $\log_4(3x-1) = \frac{1}{2}$

2. Determina los valores de a que hacen cierta la expresión: $\frac{2}{2a^2 - 10a + 12}$

3. Plantea y resuelve:

a) El producto de dos números consecutivos supera a su suma en 5 unidades.
¿Cuáles son esos número?.

b) Calcula el perímetro y el valor de cada uno de los ángulos interiores de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 30 cm y 25 cm.

4. Obtiene la mínima expresión: $\sqrt{2}(x - \sqrt{2})^2 - \left(\frac{1}{2\sqrt{2} - 4x}\right)^{-1}$

Problema	1	2	3	4
Puntaje	40	15	30	15

Autoevaluación nº 3

1. Encuentra los elementos de los siguientes conjuntos y represéntalos en el eje real

a) $A = \left\{x / \frac{3}{4}|x| + \frac{1}{4} \geq 1\right\}$

b) $B = \{x / x \neq 2; |x| < 4\}$

2. Calcular expresando cada apartado con el denominador racionalizado

a) $\left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2$

c) $\frac{x^{\frac{1}{2}} + y^{\frac{1}{2}}}{x^{\frac{1}{2}} - y^{\frac{1}{2}}}$



b) $\sqrt{8} - 2\sqrt{32} + 3\sqrt{128}$

d) $\frac{1}{\sqrt{x} \cdot \sqrt{x-1}}$

3. Resolver hasta la mínima expresión: $\frac{(a^2)^5 \cdot (b^{-6})^3 \sqrt{b^9}}{(a^{-3})^{-2} (b^4)^0}$

4. El perímetro de un rombo es de 160 cm y uno de sus ángulos interiores es de 120° .
Calcula la medida de sus diagonales.

5. ¿Verdadero o falso?. Justifica. $\frac{b^{-1} + c^{-1}}{(cb)^{-1}} : \frac{2}{(b+c)^{-1}} = \frac{1}{2}$

Problema	1	2	3	4	5
Puntaje	20	35	15	15	15

Autoevaluación nº 4

1. Encuentra la medida de la base y la altura de un triángulo isósceles cuyo ángulo opuesto a la base es de 65° y sus lados congruentes miden cada uno 415 cm.

2. Determina analíticamente que valor o valores debe asumir α en cada caso:

a. $\frac{1}{\alpha^2 + 6\alpha + 5}$ esté definido en R

b. $\sqrt{(-\alpha + 1)(\alpha + 2)}$ esté definido en R

3. Resuelve hasta obtener la mínima expresión: $\frac{r\sqrt{b}}{b^{-1}} + r \cdot b^{\frac{1}{2}} - 3r\sqrt{b^3}$

4. Un campo se ha sembrado la séptima parte de su superficie con trigo, la tercera parte de lo que queda con maíz y las 480 ha restantes con soja. ¿Cuántas ha tiene el campo?

5. ¿Para que valores de x es cierta la expresión: $\frac{3}{x^2 - x}$?

Problema	1	2	3	4	5
Puntaje	20	20	20	20	20

A CONTINUACIÓN TE PROPONEMOS ALGUNOS EXÁMENES DE INGRESO:

EXAMEN 2006 - Diciembre

1. Resuelve las siguientes ecuaciones:

a) $\frac{1}{x-1} + \frac{3}{x+1} = \frac{x}{x-1}$

b) $\frac{2^{x+1}}{8^x} = \frac{1}{16}$

2. Determina el valor de k, para el cual la ecuación: $3x^2 + (5k - 4)x + 3 = 0$, posea raíces opuestas.

3. Determina los valores de a; b y c para que sea cierta la siguiente igualdad:

$$\frac{\sqrt[3]{9x^5} \cdot x \cdot y^{-1}}{3 \cdot (x^3 y)^{-2}} = 3^a \cdot x^b \cdot y^c$$

4. Indica qué valores debe asumir la variable en cada caso, para que las siguientes expresiones resulten ciertas. Luego representa cada solución en distintos ejes reales.

a) $\sqrt[3]{\frac{7}{2x^3 - 8x}}$

b) $\sqrt{\frac{2x - 4}{-5}}$

5. Plantea y resuelve:

- a) En un restaurante ofrecen un menú económico a \$ 8 y un menú ejecutivo a \$ 15. Trece personas almorzaron juntas y gastaron \$ 146. ¿Cuántos eligieron el menú económico y cuántos el ejecutivo?
- b) La diagonal de un rectángulo es de 25 cm. Determina, en radianes el ángulo que ésta forma con la base, sabiendo que la altura del cuadrilátero es de 10 cm.

Ejercicio	1	2	3	4	5
Puntaje	20	10	15	25	30



EXAMEN 2006- Febrero

1. Expresa los siguientes enunciados algebraicamente y obtiene el valor para:

$$p = -\frac{3}{2}; q = 5$$

- a) La suma del recíproco de p y el opuesto de q
b) Al cuadrado de p restarle el cuadrado de q

2. Resuelve la ecuación: $\frac{x^2}{x+1} - \frac{2}{2x+2} = 1$

3. Resuelve el sistema de ecuaciones:
$$\begin{cases} y + x - 3 = 0 \\ x - 2(1 - y) = 2 \end{cases}$$

4. Para que valores de x, está definida en el conjunto de los números reales cada una de las siguientes expresiones? a) $\frac{1}{x^2 - 25x}$ b) $\sqrt{1 - 3x}$

5. Resuelve aplicando propiedades hasta la mínima expresión:

a) $\frac{\sqrt{\frac{x}{y}} \cdot x^{-1}}{\sqrt[5]{\frac{1}{y}}}$

b) $\frac{1}{2}\sqrt{27} - \sqrt{12} + \frac{1}{5}\sqrt{3}$

c) $(a - \sqrt{3})^2 - \sqrt{3}\left(\frac{\sqrt{3}}{3}a^2 - 2a\right)$

6. Plantea y resuelve:

- a) Calcula en radianes la medida de los ángulos interiores del triángulo rectángulo cuyos catetos miden 6 cm y 8 cm respectivamente.
b) Determina el radio de una circunferencia, sabiendo que el ángulo central de $\frac{\pi}{5}$ radianes subtende un arco de 20 cm.

Problema	1	2	3	4	5	6
Puntaje	10	15	10	20	30	15



INSTITUTO POLITÉCNICO SUPERIOR "General San Martín"
EDUCACIÓN SUPERIOR

Examen de Ingreso - MATEMÁTICA

Lunes 1 de marzo de 2010

1. Factoriza todo lo posible: $3x^4y - 6x^3y + 3x^2y$
2. Representa en el eje real, los números "x" que verifican: $x \in \mathbb{Z}; |x| \leq 2,5$
3. Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones:
$$\begin{cases} \frac{x+2y}{3} = 1 \\ x-y = -3 \end{cases}$$
4. Calcula "x".

a) $\frac{5^{x+2}}{25^x} = 5$

b) $2.(x+3) + \frac{1}{2}(x+2) = \left(-\frac{1}{6}\right)^{-1}$

c) $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - 3.\left(x - \frac{1}{2}\right) = 0$

5. Determina los valores de la variable para los cuales tienen sentido cada una de las siguientes expresiones.

a) $\sqrt[4]{\frac{-3}{6-4x}}$

b) $\sqrt{\frac{1}{(2x-1)(4-x)}}$

6. Expresa como potencia, aplicando propiedades y luego resuelve. $\frac{\left(\sqrt[5]{x^3} \cdot x^{-1}\right)^2}{x \cdot \sqrt{x}}$

7. Plantea y resuelve:

En un triángulo isósceles no equilátero, el lado desigual mide 30 cm y uno de los ángulos congruentes es de 80° . Calcula el perímetro y la superficie.

Problema	1	2	3	4	5	6	7
Puntaje	10	5	10	35	15	15	10

INSTITUTO POLITÉCNICO SUPERIOR "General San Martín"
EDUCACIÓN SUPERIOR

Examen de Ingreso – MATEMÁTICA

Lunes 28 de febrero de 2011

1. Simplifica:

$$\frac{-2a-4}{2b} \cdot \frac{a^2+4+4a}{b}$$

2. Calcula "m", si:

$$\frac{\sqrt[3]{\frac{1}{2}} \cdot 2}{8^2} = 2^{m+1}$$

3. Resuelve la inecuación y representa la solución en el eje real:

$$\frac{1-x}{2} + \frac{x}{3} \geq (-2)^{-1}$$

4. Resuelve el sistema:
$$\begin{cases} x - 2y = -6 \\ -x + y = \frac{3}{2} \end{cases}$$

5. Plantea y resuelve: En el triángulo abc, el ángulo b es recto, además el perímetro de la figura es de 21 cm. Si $\overline{ac} = 2\overline{ab} + 1\text{cm}$ y $\overline{bc} = 8\text{cm}$. Calcula la medida del ángulo c en el sistema del radián.

6. Resuelve las siguientes ecuaciones:

a) $\frac{2}{x} = x - 1$

b) $\sqrt{2x+5} - 1 = 3$

c) $\frac{1}{2}x - 3 \cdot \left(x + \frac{1}{3}\right) = \sqrt[3]{-27} + x$

Problema	1	2	3	4	5	6
Puntaje	15	15	15	10	15	30



Instituto Politécnico Superior "Gral San Martín" – 15 de marzo de 2012

Educación Superior

Examen de Matemática – Recuperatorio

Problema	1	2	3	4	5	6
Puntaje	30	15	20	10	15	10

1. Calcula x

a) $(x+3)^2 - x = 15$

b) $\frac{3+x}{2} - 2 = \left(\frac{1}{2}\right)^{-1}$

c) $\frac{1}{x} + \frac{1}{2x} = \frac{2}{3}$


2. Factorea

a) $3ax^2 + 3x^2 - 12a - 12$

b) $\frac{8}{5}ab + \frac{16}{5}ab + \frac{4}{5}b$

3. Plantea y resuelve

El perímetro del rectángulo abcd es de 110 cm y la base supera en 10 cm al doble de la altura. Calcula el ángulo que la diagonal ac forma con ad



4. Resuelve el sistema
$$\begin{cases} x + 2y = -5 \\ y - x = 2 \end{cases}$$

5. Determina los valores de "m"; "p" y "q" si:
$$\frac{\sqrt{3}a^{-1}(b^2)^3}{3^{-5}a^2b^{-6}} = 3^m a^p b^q$$

6. Calcula el o los valores de x para que cada una de las siguientes expresiones estén definidas en el conjunto de los números reales.

a) $\sqrt{-2(x+6)}$

b) $\frac{1}{x^3 - x}$



Instituto Politécnico Superior "Gral San Martín" – 25/ 2/ 13
Educación Superior - Examen de Matemática

Problema	1	2	3	4	5	6	7
Puntaje	15	10	25	10	15	15	10

1. Resuelve el sistema:
$$\begin{cases} \frac{x}{y} = 3 \\ 2x - 3\left(y + \frac{1}{3}\right) = 0 \end{cases}$$

2. Factorea:
$$-\frac{1}{2}ax^2 - \frac{3}{2}ax + \frac{1}{2}x^2 + \frac{3}{2}x$$


3. Calcula: a) $\left(\frac{1}{3}\right)^{x+1} = 9^x$ b) $\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} = \frac{1}{2}$

4. Determina el valor de "p" para que la ecuación: $x^2 + 3(p - x) = 0$ no posea solución real

5. Demuestra, aplicando propiedades la siguiente igualdad:
$$\frac{a\sqrt{9a} + \sqrt{a^3}}{2\sqrt{a^5}} = \frac{2}{a}$$

6. Plantea y resuelve:

Si $\overline{ab} = \overline{bc}$; $\overline{bn} \perp \overline{ac}$; n punto medio de $\overline{ac}$. Además: $\overline{bn} = 5\text{cm}$ y $\overline{ac} = 8\text{cm}$



Calcula la medida:

a) exacta del perímetro de $\triangle abc$

b) de $\widehat{bac}$ en el sistema del radián

7. Representa en el eje real los números x que verifican: $|x| \leq 5$; $x \in \mathbb{Z}$

Examen 2013

1. Plantea y resuelve:

Un pintor apoyó una escalera de 2,5 m contra la pared, de modo que el ángulo determinado por la escalera y el piso es de 65° . ¿a qué distancia de la pared está el pie de la escalera?

2. Determina el o los valores de la variable que hacen cierta cada una de las siguientes expresiones.

a) $\sqrt{-3x - \frac{1}{2}(x-1)}$

b) $\frac{1}{25x^3 - 100x^2}$

3. Calcula x: $\frac{1}{x+2} - \frac{1}{x-2} = 1$

4. ¿Verdadero o Falso?. Justifica.

a) $\left[\frac{\sqrt[5]{b^3} \cdot \sqrt{b^{-1}}}{b^{-2}} \right]^{-2} = b^{-\frac{11}{5}}$

b) $|x| = 5 \Rightarrow x = 5$

5. Resuelve el sistema:
$$\begin{cases} 2x + y = 1 \\ \frac{y+1}{x+3} = 5 \end{cases}$$



INSTITUTO POLITÉCNICO SUPERIOR “General San Martín”

EDUCACIÓN SUPERIOR

EXAMEN DE MATEMÁTICA - 24 de febrero de 2014

Problema	1	2	3	4	5	6
Puntaje	30	10	20	12	14	14

1. Resuelve cada una de las siguientes ecuaciones:

a) $\frac{1}{3} |2x+7| = \left(\frac{1}{9}\right)^{-1}$ c) $4(x+1) = 5x + \left(-\frac{3}{2}\right)\left(-\frac{1}{3} + x\right) + \frac{1}{2}x$

b) $\sqrt{x+3} = 1+x$

2. Expresa como potencia y luego resuelve aplicando propiedades. Indica el resultado sin

exponentes negativos: $\frac{\left(\sqrt[3]{x} \cdot x^{-2}\right)^4}{x \cdot \sqrt[5]{x^2}}$

3. Resuelve y representa en sucesivos ejes reales el conjunto de valores de la variable que hacen cierta cada proposición.

a) $\sqrt{\frac{1-x}{-3}}$

b) $\log(-2x+3)$

4. Factorea todo lo posible: a) $32 - 2x^2$

b) $x^4 - x^2 + \frac{1}{4}$

5. En un estacionamiento hay 55 vehículos entre motos y autos. Si el total de ruedas es de 170, ¿cuántas motos y autos hay?

6. En el triángulo $\triangle abc$, $\hat{b}$ es un ángulo recto, $\hat{a} = 65^\circ$ y la hipotenusa mide 6 cm. Calcula la superficie del mismo.