



LAS AVES DE CORONDA. Primera parte

M Florencia David, Claudia Nigro y Cintia Manoni

2015



Estimados/as amigos/as de Coronda y visitantes de todo el mundo, el equipo docente de la Cátedra Libre de fauna silvestre de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNR los invita a conocer las aves de esta ciudad y la región. En esta primera parte, les mostramos 20 de las 400 especies que existen en la provincia de Santa Fe.



Créditos fotográficos

Claudia Nigro 19, 32, 33, 49, 53

María Florencia David foto tapa, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 29, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 53.

Cintia Manoni 4, 5, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 35, 38, 47, 48, 49, 51

Mónica Díaz 52

Aves de Coronda : primera parte / María Florencia David ... (et.al.). - 1a ed. - Rosario : UNR Editora. Editorial de la Universidad Nacional de Rosario, 2015.

E-Book.

ISBN 978-987-702-115-8

1. Aves. 2. Conservación Ambiental. 3. Educación Universitaria. I. David, María Florencia

CDD 598.33


ISBN 978-987-702-115-8



9 789877 021158

Estimado/a amigo/a ...

A la hora de identificar las especies en el campo, es necesario conocer bien la topografía del ave, o lo que es lo mismo, su aspecto externo. El plumaje, es el carácter que más se utiliza para la identificación. Es por ello, que es importante conocer las diferentes partes del cuerpo del ave, para saber por ejemplo, cómo se distribuyen las plumas y los colores.



Orden Podicipediformes



MACA COMUN (*Rollandia rolland*)

El nombre ...

proviene de Master Gunner Rolland, uno de los tripulantes de la corbeta francesa L' Uranie que entre 1827 y 1830 cruzó el Cabo de Hornos y naufragó en Malvinas. Rolland con su habilidad para la caza, ayudó a que la tripulación sobreviviera al naufragio. Entre las especies que cazó para alimentar a sus compañeros, estaba el hasta entonces desconocido Macá común.

En el mundo se reconocen 22 especies de macaes; en Argentina, encontramos 6. El macá común, es una de ellas. Es un ave mediana, que mide entre 23 y 26 cm. Tiene un aspecto homogéneo, dorso y cuello son de un color pardo oscuro. En la época nupcial los machos presentan un penacho auricular blanco con algunas estrías negras, este adorno sirve para atraer a las hembras. Los ojos son de un llamativo color rojo. El pico es negro, corto y cónico; a diferencia de los patos, que lo tienen ancho y chato.





Los macaes son excelentes buceadores, es por ello que los vemos siempre asociados a ambientes acuáticos. Los encontramos en ríos, lagunas y hasta en espejos de agua temporarios. Es raro verlos en vuelo, solo lo hacen de noche y para habitar nuevas lagunas ... tampoco es común verlos caminar y si lo hacen es de un modo muy particular: muestran un andar erguido, algo torpe, ya que tienen las patas muy atrás.

Se alimentan de peces, larvas e insectos acuáticos; los cuales obtienen buceando. Es común verlos cazar zambulléndose y apareciendo a una corta distancia. Cuando nadan, lo hacen balanceando la cabeza de un lado a otro...Se los encuentra solos, en pareja o en grupos reducidos.



Orden Anseriformes



PATO CAPUCHINO (*Anas versicolor*)

El nombre...

Anas (Lt.) significa “ánade, pato” y *versicolor* “de varios colores, esto hace referencia a la coloración del pico: negro, celeste y anaranjado.

Miden aproximadamente 41cm. Una boina negruzca que baja hasta la nuca, mejillas y garganta de color crema, y un pico ancho y tricolor (celeste con base amarilla y culmen negro) le dan al pato capuchino un aspecto llamativo. En las hembras el pico es amarillo más pálido, particularidad utilizada para diferenciar los sexos a simple vista. En el resto del cuerpo, su plumaje es muy característico, poseen el pecho manchado y el dorso posterior de un color pardo oscuro, con grueso barrado en los flancos, mientras que el tercio posterior es gris plateado finamente barrado.



Dato útil...

Se le llama “espejo”, a las plumas brillantes y coloridas de los patos, que se pueden observar en el ala únicamente cuando está extendida durante el vuelo. En el pato capuchino, este tiene reflejos azules o verdes entre fajas blancas.



Las patas de estas aves son cortas, lo que les da un andar gracioso en tierra. Son de diferente color en machos y hembras, siendo amarillas y negras respectivamente. Sus dedos, unidos por una membrana interdigital, se transforman en verdaderos remos, lo que les facilita la natación. Viven en parejas o grupos pequeños. Buscan su alimento en la orilla de ríos o lagunas y lo hacen nadando o caminando. Tienen un vuelo rápido y con mucho batido de alas. Habitan ambientes acuáticos con vegetación.

Orden Anseriformes

CHAJA (*Chauna torquata*)



El nombre...

Chauna (Gr.) significa “esponjosa, blanda” y se refiere, según Félix de Azara, a consistencia fofa del ave y *torquata* significa “adornada con collar”.

Esta ave, de cuerpo voluminoso, posee un aspecto inconfundible. Mide entre 80 y 90 cm. Posee un pico similar al de la gallina y una coloración rojiza alrededor de los ojos. El cuello presenta dos collares, uno negro y otro blanco y se destaca en su cabeza un copete occipital, ausente en ejemplares juveniles. Su plumaje es de color gris, más oscuro en la región dorsal y más claro en la ventral. Las plumas presentan un reborde casi blanco que le da al plumaje un aspecto estriado.



Sus alas son anchas, con espolones en el borde anterior. En vuelo, muestran sus alas desplegadas de color blanco y negro que se ven desde abajo y ésto las hace parecidas a las águilas. Las patas son gruesas y de color rojizo; los dedos de estas aves carecen de membrana interdigital.





Si bien es un ave terrícola se lo encuentra siempre en zonas de lagunas, esteros y bañados, pastizales y campos húmedos del norte y centro de nuestro país. Se suele ver en pareja en la época reproductiva y en grupos numerosos en invierno. Machos y hembras no presentan dimorfismo sexual (no hay diferencias visibles entre machos y hembras) pero se los puede identificar por su canto: el macho lo hace con la inconfundible onomatopeya “chajá” del cual deriva su nombre vulgar.

Se alimenta de hierbas en las orillas.

Orden Gruiformes




GALLARETA CHICA (*Fulica leucoptera*)

El nombre...

Fulica (Lt.) significa “ave acuática” y *leucoptera* “ala blanca”, haciendo referencia al borde blanco de las alas en vuelo.

Las gallaretas son aves acuáticas de cuerpo rechoncho, fácilmente reconocibles. Son de tamaño mediano, miden entre 30 y 40 cm.

Su cuerpo es de un color negro homogéneo, desde la cabeza a la cola. El pico es delgado y alargado, de color amarillo y presentan un escudete frontal generalmente amarillo, aunque puede haber algunos naranja. Las alas son cortas y redondeadas y en vuelo, la punta de las plumas secundarias, de color blanco, forman un delicado borde. La cola es corta y con plumas subcaudales blancas que se pueden ver cuando la levanta al desplazarse en el agua.



Viven en aguas con vegetación acuática densa, con matorrales húmedos que les permitan obtener material para hacer sus nidos, que son verdaderas plataformas flotantes, y esconderse de extraños.



Se las observa generalmente en grupos numerosos y mezclados con otras aves de la misma familia, nadando en aguas abiertas o con vegetación.



Las gallaretas, como muchas aves acuáticas, para volar requieren un carreteo previo que pueden hacer en tierra o desde el agua. Una vez en vuelo, pueden realizar importantes desplazamientos aéreos, casi siempre de noche. Son aves ruidosas, lo que muchas veces permite advertir su presencia mientras se mantienen escondidas entre la vegetación. Su alimentación es a base de hierbas, semillas, invertebrados y pequeños vertebrados. Se alimenta nadando, zambulléndose o en las orillas.



Orden Gruiformes



CARAU (*Aramus guarauna*)

El nombre...

Aramus (Gr) significa “garza” y *guarauna* “ave negra”, haciendo referencia al color del carau.

El carau es un ave robusta, de 65 cm, muy similar al cuervillo, con el cual se lo sabe confundir. Presenta un color homogéneo, pardo, y un salpicado blanco a lo largo del largo cuello. El pico es largo, casi recto, de color amarillento con la punta negruzca. Las patas son largas y de color grisáceo.



Vive en ambientes acuáticos donde abunda la vegetación, que le sirve de refugio. Solo, en pareja o en grupos reducidos, se lo puede ver en el agua, en la tierra o posado sobre los árboles. Camina lento, moviendo el cuello. Emite fuertes ruidos con la onomatopeya *kraukrau*, sonido que se asemeja a su nombre vulgar.





Dato útil...

Su vuelo característico nos ayuda a diferenciarlo de otras especies: lleva el cuello extendido y algo inclinado hacia abajo, con un aleteo entrecortado y separa las plumas primarias del ala, que parecen ser dedos.

Orden Suliformes




PIGUA (*Phalacrocorax brasilianus*)

El nombre...

Phalacrocorax significa “cuervo calvo” y *brasilianus* “brasileño, de brasil”.

El biguá es un ave de tamaño mediano que mide entre 55- 75cm; se caracteriza por el negro homogéneo de su plumaje y por su largo cuello. Los juveniles muestran un color pardo y el pecho más claro. En época reproductiva, los adultos exhiben un penacho de plumas blancas en la sien. El pico de estas aves es delgado y largo, de color negro, con amarillo en la base y de bordes blancos; en su extremo presenta un gancho para evitar que el alimento, que son peces, se le resbale.



Las patas son cortas, de color negro y se ubican atrás del cuerpo, lo que les permite mantener una postura bien erecta. Todos los dedos están unidos por una membrana interdigital para facilitarles la natación. Las alas son largas y redondeadas y la cola rígida



Es característico verlos volar al ras del agua, siempre con el cuello extendido.





Habita ambientes acuáticos como lagunas, ríos, esteros, comúnmente en lugares donde hay ramas o árboles que usan como percha para posarse. Se los suele ver solos o en parejas y en épocas reproductivas forman numerosas colonias para nidificar. Nadan sumergiendo todo el cuerpo y solo dejan afuera del agua el cuello y la cabeza.

Una curiosidad...

Es muy común ver a los biguás posados con las alas extendidas, esto se debe a que a diferencia de otras aves, las plumas no son del todo impermeables; es por ello que cuando se zambulle necesita luego secar sus plumas al sol.

Orden Pelecaniformes



GARZA BLANCA (*Ardea alba*)

El nombre...

Ardea (L.) significa "garza", proviene del sánscrito "ard" que es moverse, agitarse, haciendo referencia al movimiento de estas aves y *alba* "blanco".

Es la más grande de las garzas blancas, midiendo 65cm. Su plumaje es completamente blanco, abundante y de aspecto suave. En épocas reproductivas desarrolla largas plumas despeinadas en el dorso que se denominan EGRETES y que están presentes tanto en machos como en hembras, aunque son más vistosas en los primeros. Alrededor de los ojos tiene un color verde claro a amarillo



que puede extenderse hasta el pico. El mismo, es de color amarillo anaranjado, grueso y largo.

Una curiosidad...

Se dice que el pico de estas aves es un verdadero arpón, ya que lo utilizan para "arponear" a los peces que nadan cerca de la superficie del agua.

El cuello largo, fino y muy flexible es característico de esta especie; puede verse extendido cuando camina o replegado en forma de S cuando está en reposo o durante el vuelo. Esto la diferencia de cigüeñas y bandurrias, que lo estiran al volar. Las patas son de color negro, muy largas lo que le permite nadar en aguas poco profundas o levantar vuelo rápidamente pero no correr. Durante el vuelo se las observa extendidas. En los ejemplares juveniles, pueden verse de color verde negruzco.



Elige como hábitats ambientes acuáticos: ríos, lagunas, esteros. Es común encontrarlas entre los juncos o en lo alto de los árboles próximos al agua. Se la puede ver sola o formando grandes grupos incluso junto a otras Garzas como Mora o Azulada o junto a individuos de otras familias como biguá, gaviotas, espátulas, cuervillos y gallaretas. Se alimenta de peces, que ingieren enteros, ranas, renacuajos e insectos acuáticos. Pero además consumen algunos reptiles, pequeños roedores e insectos terrestres cuando se alejan de la orilla



Una curiosidad...

Las garzas blancas estuvieron, durante parte del siglo XIX y XX, al borde de la extinción, debido a que durante mucho tiempo fueron cazadas para utilizar sus plumas como adornos de sombreros de lujo.

Orden Pelecaniformes



CUERVILLO DE CAÑADA (*Plegadis chihi*)

El nombre...

Plegadis significa “el que lleva guadaña” y alude a la forma del pico de estas aves, que es curvo y delgado; y *chihi* es la onomatopeya de la vocalización.

Este cuervillo mide aproximadamente 45-50cm. Su cuerpo es de color castaño oscuro, con la cabeza y el cuello rojizos. El plumaje de las alas es iridiscente, con reflejos metálicos verdosos y azules, aunque puede verse totalmente negruzco según la incidencia de la luz solar. Los ejemplares jóvenes presentan en la cabeza y parte de cuello manchas blancas. Es característico de estas aves el pico largo, fino y curvo, el cual le sirve para localizar mediante el tacto los invertebrados de los cuales se alimenta.



El cuello es largo al igual que las patas y los dedos no presentan membranas entre sí.



Habita ambientes acuáticos y áreas rurales. Forman grandes colonias y se los puede ver mezclados con ejemplares de otras especies como teros, garzas, playeros, pitotoy, o espátulas. Es muy común verlos en la orilla, con el pico sumergido buscando alimento, que se basa principalmente en invertebrados, vegetales y algunos peces pequeños.





Vuelan con fuerte aleteo, en grandes bandadas formando una “V”, con las patas extendidas que sobrepasan la cola y el cuello estirado; característica, esta última, que los diferencia de las garzas.



Orden Ciconiformes




CIGÜEÑA (*Ciconia maguari*)

El nombre...

Ciconia significa “cigüeña” en latín y *maguari* significa “muchas que pasan en fila”, aunque comúnmente se la observa sola.

Es un ave muy grande. Mide entre 90 y 120cm. El cuerpo es de color blanco con el tercio posterior negro y el contorno de los ojos es rojo. Los juveniles son de color pardo negruzco pero a medida que crecen, se vuelven blancos. Las alas son grandes y al vuelo las extiende mostrando las plumas de las alas negras. El pico de las cigüeñas es largo y puntiagudo, de color gris claro en la base y oscuro en la punta. El cuello es largo y al vuelo, lo lleva extendido. Las patas, también largas, son de un atractivo color rojo.



Una curiosidad...

El pico de las cigüeñas presenta una abertura en la base, lo que permite que se expanda la garganta para tragar el alimento entero.



Elige los ambientes acuáticos, pero también se la puede ver en el campo, especialmente en época de lluvias abundantes. Si bien son solitarias, se pueden encontrar en parejas o grupos reducidos en lugares donde abunde el alimento. Son muy poco activas; es común verlas inmóviles largo rato, a la espera de que su presa se acerque. Poseen una dieta muy variada a base de peces, ranas, pequeños reptiles, invertebrados varios y hasta roedores pequeños. El inicio del vuelo es lento, comienza con aleteos torpes pero enérgicos seguido de un carreteo corto. Ascenden a gran altura favorecidas por las corrientes de aire cálido y allí se las ve planear en círculo, imitando el vuelo de águilas y jotes. Algo bien curioso es su nido, se trata de una gran plataforma sólida, construida con diversos vegetales. Son tan fuertes, que podrían soportar el peso de una persona.



Orden Charadriiformes





JACANA (*Jacana jacana*)

El nombre...

Nombre tupí, significa “el que tiene el ojo alerta”


Se la conoce también como Gallito de agua. Mide entre 20 y 25 cm, siendo la hembra más grande que el macho. Cabeza, cuello y zonas ventrales del cuerpo son de color negro brillante mientras que el lomo y alas son castaño rojizo. Las plumas primarias y secundarias del ala son de color amarillo verdoso, detalle muy llamativo, que se observa cuando está en vuelo o extiende las alas. Éstas, presentan un espolón. Su pico de color amarillo, es fino, largo y presenta un escudete rojo.



Las patas son largas (13 cm) al igual que los dedos, los cuales además son finos y se los puede ver claramente cuando vuelan, ya que los llevan extendidos.



Los ejemplares juveniles suelen verse entre los adultos y el plumaje es algo diferente: de un color blanco vistoso en ventral y en las cejas y el dorso cambia a pardo.



Orden Charadriiformes



RAYADOR (*Rhynchops niger*)

El nombre...

Rhynchop (Gr.) significa “cara pico” y hace referencia al enorme pico; mientras que *niger* (Lt.) es “negro”.




El aspecto “achaparrado” junto al desproporcionado pico, le dan al rayador, un aire singular. Esta ave que mide entre 40- 45 cm, es de color pardo negruzco en el dorso y blanco en la zona ventral. Las patas son cortas, de color rojo intenso y presentan membranas entre los dedos. La cola es larga de color oscura. El pico, prominente, es rojo en la base y negro en la punta.

Una curiosidad...

El pico del rayador es único entre las aves, la mandíbula superior es mucho más corta que la inferior.

Habitan ambientes acuáticos como ríos y lagunas; también se los ve en la orilla del mar. Es común verlos formando grandes bandadas, mirando todos para el mismo lado. Se mezclan con otras aves en bancos de arena de ríos y lagunas, lugares donde se concentra su alimento. Es común verlos descansar con el pico escondido entre las plumas del dorso. Levantan vuelo todos juntos, asentándose a corta distancia cuando se sienten amenazados o en tandas, para buscar su alimento.



El rayador le debe su nombre vulgar a su particular técnica de caza, única entre las aves: vuela en línea recta, muy cerca del agua, con las alas hacia arriba para no mojarlas; con la cabeza hacia abajo y el pico abierto de tal manera que con la mandíbula inferior sumergida, parece “rayar” el agua. Cuando obtiene la presa, la aprieta bien fuerte, dobla la cabeza hacia atrás para asegurársela y luego la traga. Para cazar, prefiere el final de la tarde y noche. Se alimenta de peces pequeños, crustáceos y organismos que puedan encontrarse flotando en el agua.



Orden Charadriiformes



ATI (*Phaetusa simplex*)

El nombre...

Phaetusa (Gr.) significa “la brillante” y *simplex* “simple, puro”.



El Atí mide entre 35 y 40 cm de longitud. Su aspecto es similar al del rayador. La corona es color negro y se extiende hasta alrededor de los ojos, el dorso es gris y el resto del cuerpo blanco. Las alas, al igual que el cuerpo, son tricolor, y al vuelo se observa un patrón muy llamativo: en dorsal es gris, seguido de una franja blanca y las puntas son negras. La cola es larga, de color negro. El pico es grande y robusto, color amarillo al igual que las patas. Estas son cortas y entre sus dedos presentan una membrana.



Habita ambientes acuáticos como ríos y lagunas, pero prefiere los lugares donde hay dunas o bancos de arena. Se lo ve solo o en pareja, y forma grandes bandadas con aves de otras especies. Es muy común verlos mezclados con los gaviotines, aves que tienen una forma muy similar, pero se los diferencia a simple vista por su tamaño: el Atí es bastante más grande.





Las bandadas suelen estar asentadas en los bancos de arena y levantan vuelo y todas al mismo tiempo, cuando se sienten amenazadas. También es común verlos posados en ramas o troncos que sobresalen del agua. Vuelan bajo, mirando la superficie del agua y se zambullen para pescar o cazar insectos al vuelo.

Orden Charadriiformes



GAVIOTIN CHICO COMUN (*Sterna superciljalis*)

El nombre...

Sterna (lg) significa "golondrina de mar" y *superciljalis* "que tiene ceja".

Este gaviotín mide entre 20 a 25 cm y su tamaño, es una de las características más relevantes para diferenciarlo con el Atí; que es más grande y con el que comúnmente se encuentra. En la cabeza, nuca y alrededor de los ojos, su plumaje es negro; mientras que en la frente y cejas es blanco. El cuerpo es delgado, de color gris en el dorso y blanco en la parte ventral. Las alas son grises con las puntas negras.



El pico es fino y recto y de color amarillo. Las patas son muy cortas y también amarillas. La cola es negra, larga y con forma de horquilla. Se los encuentra en ambientes acuáticos, lagunas, ríos y bañados, posados sobre bancos de arena y es común verlo parado sobre postes de alambrados o troncos, que sobresalen del agua.



Generalmente se los ve en parejas o en bandadas pequeñas, y es común verlos mezclados entre otras especies, principalmente con el Atí. Son muy ágiles durante el vuelo. Se alimentan de peces y anfibios pequeños, que capturan volando al ras del agua, con el pico hacia abajo o zambulléndose.



Orden Cuculiformes



PIRINCHA (*Guira guira*)

El nombre...

Guira en lengua guaraní significa “ave, pájaro”.



Mide aproximadamente 40 cm. Su cuerpo es esbelto, alargado y su plumaje es “desordenado”, de aquí su nombre vulgar. La parte dorsal es de color pardo negruzco, con estriado blanco y la parte ventral, es color crema con estriado oscuro en el pecho. Presenta un característico copete despeinado, eréctil, de color canela. El pico es corto, curvo y de color anaranjado y el iris es claro.



Otra característica distintiva, es su larga cola que suele caer péndula y es de tres colores: canela, pardo oscuro y blanco. Posee patas cortas y cuatro dedos, el primero y el cuarto dirigidos hacia adelante y los otros dos, hacia atrás; esta disposición de los dedos le permite trepar. Las pirinchas viven en grupos pequeños y se las suele ver acicalándose mutuamente o sacándose parásitos externos, por lo que en algunos lugares a este ave se lo llama “piojoso”. Vuelan en fila, de forma lenta, con algunos aleteos, y planeos prolongados. Buscan su alimento caminando en el suelo. Su dieta es variada, se alimentan de insectos, anfibios, reptiles, frutos, huevos y pichones de otras aves.



Habita ambientes abiertos con árboles, tanto en la ciudad como en zonas rurales. Se los ve en grupos numerosos y son muy bullangueros. Posan en los árboles de espalda al sol y duermen formando grupos de varios individuos apretados unos con otros. Esto les permite abrigarse del frío ya que son muy sensibles a las bajas temperaturas.

Orden Piciformes




CARPINTERO REAL COMUN (*Colaptes melanochloros*)

El nombre...

Colaptes (Gr.) significa “picoteador” y *melanochloros* “negro y verde”.

Este carpintero es el más frecuente de observar. Mide entre 23 y 26 cm. Presenta un plumaje muy colorido. La parte dorsal del cuerpo es blanca con barrado negro. La cara es de color crema, con la zona malar roja, boina negra y nuca roja (en el macho). La hembra se diferencia del macho, porque tiene la zona malar negra. La garganta es estriada blanca y negra, el pecho es amarillo con lunares negros y el resto de la parte ventral es blancuzca, con punteado también negro. Se caracteriza por presentar un pico



fuerte, recto y agudo que le permite cavar la madera de los árboles, de aquí su nombre vulgar: carpintero.

La cola es rígida y junto a la disposición de los dedos, le permite apoyarse de manera vertical en los troncos. Esta es una de las formas más características de verlo.



Habita áreas urbanas y suburbanas de todo el país, siempre que haya árboles, ya que constituyen su fuente de alimento y lugar de nidificación. Se lo ve en parejas o en grupos pequeños. Puede encontrárselo en el suelo, pero lo más común es verlo pegado a los troncos o trepando. De esta manera obtienen su alimento a base de insectos, gusanos y larvas que viven en la corteza o áreas descompuestas de la madera, prestándole así un gran servicio al árbol. Su vuelo es bajo y ondulante. El nido, que es muy característico, es construido con golpeteos rítmicos del pico en el tronco hasta que se forma un hueco profundo, con entrada circular.

Orden Passeriformes



VARILLERO NEGRO (*Agelaius cyanopus*)

El nombre...

Agelaius (Gr.) significa “gregario”, hace referencia a que esta ave cría en colonias y forma grandes bandadas en el invierno y *cyanopus* “de pies azul oscuro”.

El varillero negro mide 19 cm, aproximadamente. Los machos son totalmente negros y su plumaje es muy brillante. La hembra es diferente al macho: la zona ventral del cuerpo es amarilla, mientras que dorso, flancos y cabeza son marrones con estrías negras. La cola también es de color negra. El plumaje de los juveniles es similar al de las hembras. Cuando los machos juveniles pasan al plumaje adulto definitivo, comienzan a cambiar las plumas desde la cabeza. El pico es cónico, recto y agudo.



Macho

Dato útil...

Es fácil confundir al varillero negro con otra ave gregaria, el tordo renegrido. Se los puede diferenciar en el brillo del plumaje: en el varillero es negro azabache, mientras que en el tordo los reflejos son azul-violáceos.



Habita ambientes acuáticos: pastizales y pajonales en esteros, bañados y alrededores. Se lo ve en pareja o en pequeños grupos, entre la vegetación acuática flotante o en los árboles en la orilla, donde encuentran su alimento: semillas, frutos e insectos.



Orden Passeriformes



CURUTIE COLORADO (*Certhiaxis cinnamomea*)

El nombre...

Certhiaxis (Gr.) significa “de pico curvo” y *acinnamomea* “acanelado, de color canela”.

Esta ave de cuerpo pequeño mide entre 13 y 15 cm. Presenta el dorso de color castaño y la zona ventral blaucuzca, al igual que las cejas. Es llamativo el color amarillo de la garganta, el cual es más manifiesto en los juveniles. El pico es corto y puntiagudo de color negro. Las alas son cortas y redondeadas y al igual



que la corona son de un color rojizo con las puntas más oscuras. La cola es larga, rígida y escalonada, redondeada en la punta, y de color rojizo como las alas.



Habita zonas de bañados y humedales. Es muy inquieto y confiado. Se lo suele ver en pareja y junto a la vegetación más próxima al agua, en busca de alimento. Su dieta se basa en pequeños insectos y otros artrópodos, que atrapa entre las hojas de las plantas acuáticas.



Orden Passeriformes



VIUDITA BLANCA (*Fluvicola albiventer*)

El nombre...

Fluvicola (Lt.) significa “la que vive en el río” y *albiventer* “vientre blanco”, haciendo referencia al color blanco del vientre.

Esta llamativa ave mide unos 12 cm. Presenta la cabeza y partes ventrales del cuerpo de color blanco; mientras que la nuca, el dorso y las alas son de un contrastante color negro. Las alas, presentan filetes blancos que desaparecen con el tiempo a causa del desgaste. El pico es fino y la cola es corta; ambos son negros. Se la suele encontrar en parejas o en grupos pequeños. Frecuenta bañados o humedales donde se disimula entre la vegetación acuática. Se alimenta de insectos, que obtiene desde árboles bajos



que usa como perchas o caminando sobre la vegetación acuática o a orillas del agua.



Orden Passeriformes



CARDENAL COMUN (*Paroaria coronata*)

El nombre...

Paroaria es nombre tupí y *coronata* significa “con corona”, haciendo referencia al copete.



El cardenal es, sin duda, una de las aves canoras más conocida por todos. Mide entre 17 y 19 cm. Cabeza y pecho son de un color rojo brillante; en los juveniles esta zona es parda o rojo pálido y se vuelve roja brillante a medida que crecen. Un vistoso copete rojo adorna la cabeza de este ave. Por detrás de la cabeza, se puede observar un collar de color blanco. El dorso del cuerpo es plumizo y la zona ventral, blanca. El pico es claro, robusto, corto y cónico. Las patas son cortas, de color negro.

Se lo puede encontrar en zonas de arbustos o monte abierto y en épocas invernales se lo ve en el suelo, buscando semillas, que son la base de su dieta. Se lo puede observar en pareja o en grupos, a veces numerosos.



Protegidos por la Ley ...

El cardenal, junto a otras muchas aves, es una especie muy frecuente de encontrar en cautiverio. Este hecho, lamentable y común, representa un acto delictivo. Toda la fauna silvestre argentina, está protegida por la Ley Nacional 22.421, la cual prohíbe terminantemente la compra, venta y tenencia de nuestros animales silvestres.

Orden Passeriformes



SIETEVESTIDOS

(*Doospiza nigrorufa*)

El nombre...

Doospiza (Gr.) significa “pinzón de la hierba” y *nigrorufa* “negra y roja”, haciendo referencia a los colores.

Es un ave pequeña, que mide entre 13 y 15 cm. Posee un plumaje gris pardo en el dorso y castaño rojizo en la zona ventral. A nivel del abdomen presenta una mancha blanca. La cabeza es gris oscura, con antifaz negruzco. Se destacan en esta zona cejas y malar de color blanco. El pico es negro, corto y fino. Las alas y la cola son negruzcas. Los juveniles se diferencian por su color más pardo y por presentar manchas blancas en la parte ventral del cuerpo y en el pecho.



Habita en zonas húmedas, de bañados y pastizales altos, zonas de arbustos y matorrales. Se lo ve solo o en pareja, pero es más común oírlo que verlo. Realiza vuelos cortos y bajos o se posa en perchas, donde se lo oye cantar. Su dieta se basa en semillas e insectos.



Nosotras...



Glaudia Nigro

Médica Veterinaria. Especialista en Salud Animal, con orientación en Epidemiología

Cátedra Libre de fauna silvestre

Cátedra de Medicina Veterinaria, Manejo y Conservación de fauna silvestre

Facultad de Ciencias Veterinarias-Universidad Nacional de Rosario

María Florencia David

Licenciada en Biología, con orientación en Zoología

Cátedra Libre de fauna silvestre

Cátedra de Medicina Veterinaria, Manejo y Conservación de fauna silvestre

Facultad de Ciencias Veterinarias-Universidad Nacional de Rosario

Gintia Manoni

Cátedra Libre de fauna silvestre

Cátedra de Medicina Veterinaria, Manejo y Conservación de fauna silvestre

Facultad de Ciencias Veterinarias-Universidad Nacional de Rosario

Nuestros sitios:

www.catedralibrefaunasilvestre.blogspot.com

<https://www.facebook.com/catedralibrefaunasilvestre>

<https://www.facebook.com/catedralibrede.faunasilvestre>
conservacionfaunasilvestre@gmail.com

Bibliografía

Ares, R. Aves: vida y conducta. Ed. Vázquez Macini, 288pp. Buenos Aires. 2007.

Azpiroz, A. B. 2012. Aves de las Pampas y campos de Argentina, Brasil y Uruguay. Una guía de identificación. PRESSUR, Nueva Helvecia, Uruguay.

Narosky, T. y Ruda Vega, M. 2009. Aves argentinas, un vuelo por el mundo silvestre. 1a ed., Buenos Aires: Albatros.

Narosky, T y Yzurieta, D. 2003. Aves de Argentina y Uruguay, guía para la identificación: edición de oro. 15a ed., Buenos Aires: Vazquez Mazzini.

<http://avesdelnea.blogspot.com.ar>.